

0. 5. Orn.
Friedländer
ohn, Berlin.

591995


Handwritten:
Herrn M. G. A. M.
Vorsitz

591.945

CATALOGHI
DEGLI
UCCELLI E DEGLI INSETTI
DELLE PROVINCE
DI PADOVA E VENEZIA

COMPILATI DAL NOBILE SIGNOR CONTE

NICOLÒ CONTARINI
DEL FU BERTUCCO.



BASSANO
TIPOGRAFIA BASEGGIO EDIT.
1845.

CATALAN

1891

JOSEPH E. BEECHER

JOSEPH E. BEECHER

JOSEPH E. BEECHER

JOSEPH E. BEECHER

JOSEPH E. BEECHER

JOSEPH E. BEECHER



LIBRARY

JOSEPH E. BEECHER

1891

273
d75
1843
SCHWRTS

AGLI AMATORI

DELLA

STORIA NATURALE

L'AUTORE.

Presento ai Naturalisti due Cataloghi, uno sopra gli Uccelli, e l'altro sopra gli Insetti, che io compilai dietro le replicate inchieste fattemi ed a voce e con Lettera dal Nob. Sig. Co. Cav. Niccolò da Rio Assessore della Presidenza Generale della Quarta Riunione degli Scienziati Italiani, che ebbe luogo nel Settembre 1842 nella dotta Città di Padova. Tali Cataloghi doveano, in unione a quelli dei Quadrupedi, Rettili, Pesci, Conchiglie, ec., formar parte della Guida gentilmente distribuita ai Membri di quella Riunione dall'Inclito Municipio di quella Città, quale Statistica delle Produzioni di così vasta Provincia; ma siccome coll'aggiunta di essi sarebbe quella divenuta di una mole troppo incomoda all'uso, così ne fu ommessa la loro pubblicazione. Ora per aderire al desiderio esternato dalla Sezione di Zoologia del suddetto Congresso, e principalmente a quello di Sua E. il Principe Carlo Bonaparte della quale ne era il Presidente, faccio di Pubblico diritto quelli degli Uccelli e degli Insetti, sperando di far cosa grata agli amatori di queste scienze.

La Classificazione da me seguita per gli Uccelli è quella indicata dal celebre Temminck nel suo Manuel d'Ornithologie, la quale abbenchè non sia delle migliori, è però fin' ora da noi adottata. Il numero degli Uccelli de' quali io potei verificare la comparsa ascende a trecento e trentanove. Avverto che tanto di questi come degli Insetti io riunisco quelli che si trovano o compariscono nelle due Provincie di Padova e Venezia, le quali essendo limitrofe hanno in gran parte comuni le stesse specie. Fra gli Uccelli faccio conoscere quelli che si tengono in domesticità, quelli che sono stazionarij o quasi stazionarij, e che nidificano: se compariscono in Primavera, in Estate, in Autunno, o nel Verno: se di semplice o doppio passaggio, e se questo loro passaggio sia irregolare o accidentale: finalmente se per la loro comparsa dir si possano rari, o rarissimi. Ventidue sono le specie domestiche, 57 le stazionarie o quasi, 181 quelle che nidificano, 58 quelle che appariscono in Primavera, 11 nell'Estate, 15 in Autunno, 29 nell'Inverno, 95 quelle di doppio passaggio, tre di passaggio irregolare, 30 di passaggio accidentale, 92 i rari, e 25 i rarissimi. Molti Uccelli in queste cifre numeriche figurano più volte, mentre li stazionarij, per esempio, sono compresi pure fra quelli che nidificano. Così quelli di doppio passaggio fanno pur parte fra quelli che si veggono in altre stagioni; ed i rari, o rarissimi ebbero già luogo anche altrove. In quanto a quelli che nidificano, io volli nominare gli autori delle nostre Ornitologie che ne hanno fatto cenno, non facendomi però garante su quanto essi dissero in tal riguardo; ed allorchè io adopero semplicemente la parola nidifica, intendo di farlo per quelli, i nidi de' quali furono da me ritrovati ed esaminati. Aggiungo poi a tutti il nome volgare più usitato, mentre troppo lungo sarebbe se io volessi in un Catalogo riportare le varie denominazioni che loro vengono date ne' diversi Paesi, ed anche soltanto in queste due Provincie.

In quanto agli Insetti mi limito soltanto ad indicare sopra qual pianta o parte di essa siano più comuni, se nella terra, nelle materie animali, nell'acqua, ec., essi abitino a preferenza; come pure se siano rari, o rarissimi, o tenuti in domesticità, riportando ad essi pure i nomi volgari con cui vengono conosciuti, qualora ne abbiano. Io annovero 2462 specie di Insetti, e vi comprendo gli Apterì, e gli Alati seguendo il sistema indicato dal Latreille nel suo Genera Crustaceorum et Insectorum. Conosco già che questo sistema non sarebbe or da adottarsi per la Classificazione di una numerosa Raccolta, ma trattandosi di un semplice Catalogo pensai di attenermi a quello. Cento e sessanta sono gli Apterì, 901 li Coleotteri, 44 li Ortotteri, 248 gli Emitteri, 49 li Neurotteri, 561 gli Imenotteri, 404 li Lepidotteri, 238 li Ditteri. Uno solo poi forma l'ottavo ordine detto Suctoria da Latraille, che è la Pulce. Non vi riportai Sinonimie nè di generi nè di specie, mentre troppo lungo sarebbe riuscito il mio lavoro.

Non presumo io già in questi Cataloghi di tutti indicare gli esseri appartenenti a queste due numerose Classi di animali, conoscendo benissimo che un numero grandioso di specie vi dovranno ancora aver luogo, specialmente fra gli Insetti, moltissimi tenendone ancora di nuovi, e di incerti.

Accolgano gli Amatori Naturalisti quel poco che ora loro presento, lusingandomi di poter loro offrire in seguito una storia più diffusa di quegli esseri, dei quali non fo qui che accennare il nome.



CATALOGO degli uccelli stazionarij, di passaggio annuale, doppio o accidentale, o tenuti in domesticità, delle Provincie di Padova e Venezia e suoi contorni, disposti secondo il *Manuel d' Ornithologie di Temmink. Paris 1820, 1835, e 1840*; compilato dal Nob. Sig. Co. Nicolò Contarini del fu Bertucci di Venezia.

RAPACES.

Vultur fulvus. Linnæi.	Avvoltojo.	Passaggio accidentale.	Raro.	
Falco peregrinus. Linn.	Falchetton. Falcon.	Comparisce d'inverno.	idem.	Nidifica secondo il P. ^r Catullo. (1)
• — subbuteo. Latham.	Falchetto grosso.	idem.		id. Catullo.
• — æsalon. Temmink.	Falchetto.	idem.		id. Catullo.
• — tinnunculus. Linn.	Storella. Falchetto.	Quasi stazionario.		Nidifica.
• — tinnunculoides. Natter.	Storella piccola.	Passaggio accidentale.	Rarissimo.	
• — rufipes. Bechsteim.	Falchetto ballarin.	Comparisce in primavera.		
• — imperialis. Temm.	Aquila.	idem. d'inverno.	Raro.	
• — fulvus. Linn.	Aquila nera.	idem. idem.	idem.	Nidifica. Catullo.
• — nævius. Linn.	Aquilotto macchia.	idem. idem.	idem.	
• — brachydactylus. Wolf.	Aquilotto.	idem. idem.	idem.	Nidifica. Catullo, e secondo il Baseggio. (2)
• — haliaëtus. Linn.	Aquila pescatrice.	idem. idem.	idem.	
• — leucocephalus. Linn.	Aquila a testa bianca.	idem. idem.	idem.	
• — albicilla. Lath.	Aquila de mar.	idem. idem.	idem.	
• — palumbarius. Linn.	Falchetton. Terzolo.	Passaggio accidentale.	idem.	
• — nisus. Linn.	Storella. Falchetto.	Quasi stazionario.		Nidifica.
• — milvus. Linn.	Pogiarico. Forfeson.	Stazionario l'inverno.	Raro.	
• — ater. Linn.	Falchetton.	Di passaggio accidentale.	idem.	
• — buteo. Linn.	Pojana. Poja.	Stazionario.		Nidifica.
• — apivorus. Linn.	Falchetto.	Passaggio accidentale.	Raro.	
• — lagopus. Linn.	Pojana. Poja.	Comparisce d'inverno.	Raro.	
• — rufus. Linn.	Pojana de Valle.	Stazionario.		Nidifica.
• — cyaneus. Gmel.	Falchetto bianco.	Passaggio accidentale.	Piuttosto raro.	Nidifica secondo il Catullo.
• — cineraceus. Montagu.	Falchetton. Falchetto rosso.	idem.	Raro.	

NOCTURNI.

• Strix Aluco. Meyer.	Allocato. Zoeton.	Comparisce d'autunno.	Raro.	Nidifica. Catullo.
• — flammea. Linn.	Allocco comune. Barbazane.	Stazionario.		Nidifica.
• — Noctua. Retz. Passerina Auctor.	Civetta svelta.	idem.		Nidifica.
• — tengmalmi. Gmel.	Civetta.	idem.		Nidifica.
• — brachyotos. Latham.	Allocco de Palù.	Comparisce in primavera.		
• — bubo. Linn.	Barbazane grande, gran Dugo.	Passaggio accidentale.	Raro.	Nidifica secondo il Baseggio, ed il Catullo.

(1) Trattato sopra la costituzione Geognostico-Fisica dei Terreni alluviali, o postdiluviani delle Provincie Venete, di Tommaso Catullo, ec. Padova 1838 ove da il Catalogo degli Uccelli del Bellunese.

(2) Degli uccelli dei contorni di Bassano enumerazione di Gio. Battista Baseggio. Biblioteca Italiana.

• <i>Strix otus</i> . Linn.	Barbazane piccolo.	Comparisce in primavera.	Nidifica secondo <i>Baseggio, Catullo,</i> <i>lo, e Naccari. (1)</i>
• — <i>Scops</i> . Linn.	Chiò. Chiusso.	Stazionario.	Nidifica.

OMNIVORES.

• <i>Corvus Corax</i> . Linn.	Corvon.	Di passaggio l'autunno.	Raro.	Nidifica. <i>Catullo.</i>
• — <i>Corone</i> . Linn.	Corvo. Corbo.	Doppio passaggio. Si tratta l'inverno.		
• — <i>Cornix</i> . Linn.	Cornacchia.	id.		Nidifica.
• — <i>frugilegus</i> . Linn.	Corvo. Corba.	id.		
• — <i>monedula</i> . Linn.	Corvetto. Taccola.	Passaggio accidentale.	Raro.	Nidifica.
• <i>Garrulus pica</i> . Temm.	Gazza nera. Checca.	Stazionario.		
• — <i>glandarius</i> Temm.	Gazza rabbiosa.	id.		Nidifica.
	Gazza rossa.			
• <i>Nucifraga Caryocatactes</i> .	Brisson. Corbo macchià.	Passaggio accidentale.	Raro.	
• <i>Pyrrhocorax alpinus</i> . Viell.	Zorla.	id.	Raro.	Nidifica. <i>Catullo.</i>
• — <i>graculus</i> . Temm.	Zorla.	id.	Rarissimo.	
• <i>Bombycillagarrula</i> . Temm.	Garulo de Boemia.	Comparisce accidentalmente in primavera.	Rarissimo.	
• <i>Coracias garrula</i> . Linn.	Gazza marina.	id.	Raro.	
• <i>Oriolus galbula</i> . Linn.	Beggiòra. Meggiòra.	Doppio passaggio.		Nidifica.
• <i>Sturnus vulgaris</i> . Linn.	Striolo. Stornello.	id.		Nidifica.
• <i>Pastor roseus</i> . Temm.	Tordo della Russia.	Passaggio accidentale in Giugno.	Raro.	
	Merlo color de rosa.			

INSECTIVORES.

• <i>Lanius excubitor</i> . Linn.	Redestola falconiera.	Comparisce in primavera.		Nidifica.
• — <i>meridionalis</i> . Temm.	Redestola.	id.	Raro.	Nidifica.
• — <i>minor</i> . Gmel.	Redestola piccola.	id.	Raro.	Nidifica.
• — <i>rufus</i> . Brisson.	Redestola rossa.	id.	Raro.	Nidifica.
• — <i>collurio</i> . Briss.	Redestola. Cavazua.	Doppio passaggio.		Nidifica.
• <i>Muscicapa grisola</i> . Linn.	Orbaròlo. Grisetto.	Comparisce in primavera.		Nidifica. <i>Catullo.</i>
• — <i>albicollis</i> . Temm.	Battiale a collo bianco.	id.		Nidifica. <i>Baseggio,</i> <i>e Catullo.</i>
• — <i>luctuosa</i> . Temm.	Battiale moro.	id.		Nidifica. <i>Baseggio,</i> <i>e Catullo.</i>
• — <i>parva</i> . Bechst.	Battiale piccolo.	id.	Raro.	Nidifica. <i>Catullo.</i>
• <i>Turdus viscivorus</i> . Linn.	Tordo Gazzaro.	Doppio passaggio.		Nidifica.
• — <i>pilaris</i> . Linn.	Gazzanella. Tordo Colombin.	id.		Nidifica. <i>Naccari.</i>
• — <i>musicus</i> . Linn.	Tordo da uà.	Doppio passaggio.		Nidifica.
• — <i>iliacus</i> Linn.	Tordo spinariel.	id.		Nidifica. <i>Catullo.</i>
	Sisarin.			
• — <i>torquatus</i> . Linn.	Merlo a petto bianco.	Passaggio accidentale.	Raro.	Nidifica. <i>Catullo.</i>
• — <i>Merula</i> Linn.	Merlo. Merlotto.	Stazionario.		Nidifica.
• — <i>saxatilis</i> . Lath.	Codarosso de Monte.	Passaggio accidentale.	Raro.	Nidifica. <i>Baseggio,</i> <i>e Catullo.</i>
	Corossolon.			

(1) Ornitologia Veneta, ossia Catalogo degli uccelli della Provincia di Venezia di Fortunato Luigi Naccari, ec. Treviso 1823.

• <i>Turdus cyaneus</i> . Gmelin.	<i>Passera solitaria</i> .	Passaggio accidentale.	Raro.	Nidifica. <i>Basegg.</i> e <i>Catullo</i> .
• <i>Cinclus aquaticus</i> . Bechst.	Merlo d'acqua.	Comparisce l'inverno.		Nidifica. <i>Catullo</i> .
• <i>Sylvia turdoides</i> . Meyer.	Celega palugana. Canellon.	Doppio passaggio.		Nidifica.
• — <i>fluviatilis</i> . Meyer.	Foracanelle foresto.	Passaggio accidentale.	Raro.	
• — <i>locustella</i> . Lath.	Orbaròlo.	Comparisce d'autunno.	Raro.	Nidifica. <i>Catullo</i> .
• — <i>phragmitis</i> . Bechst.	Macaronsin.	Doppio passaggio.		Nidifica.
• — <i>arundinacea</i> . Lath.	Fora rè. Fora canelle.	id.		Nidifica.
• — Cetti. Marmora.	Rossignol de palù.	Comparisce in primavera.		
• — <i>luscinioides</i> . Savi.	Rossignol de palù fo- resto.	Passaggio accidentale.	Rarissime.	
• — <i>luscinià</i> . Lath.	Rossignòlo.	Doppio passaggio.		Nidifica.
• — <i>philomela</i> . Bechst.	Rossignolo de Ger- mania, o Todesco.	Passaggio accidentale.	Rarissimo.	
• — <i>Melanopogon</i> . Temm.	Caonero foresto.	id.	Rarissimo.	
• — <i>sericea</i> . Natter.	Rossignolo de palù.	Comparisce in primavera.	Raro.	
• — <i>aquatica</i> . Lath.	Risaròlo. Cannelto.	Doppio passaggio.		Nidifica.
• — <i>palustris</i> . Bechst.	Fora canelle.	id.		Nidifica.
• — <i>orpea</i> . Temm.	Beccafigo foresto.	Passaggio accidentale.	Rarissimo.	Nidifica. <i>Catullo</i> .
• — <i>nisoria</i> . Bechst.	Bianchetton. Beccafigon.	Doppio passaggio.		Nidifica.
• — <i>atricapilla</i> . Lath.	Caonero il maschio.	id.		Nidifica.
	Caorossola femmina.			
• — <i>melanocephala</i> . Lath.	Caonero foresto.	Passaggio accidentale.	Rarissimo.	
• — <i>hortensis</i> . Bechst.	Beccafigo.	Passa da Agosto a Ottobre.		Nidifica. <i>Catullo</i> .
• — <i>cinerea</i> . Lath.	Rossetto. Beccafigo. Celega.	Doppio passaggio.		Nidifica.
• — <i>curruca</i> . Lath.	Bianchetta. Canevarola.	id.		Nidifica.
• — <i>passerina</i> . Lath.	Rossetto foresto.	Passaggio accidentale.	Rarissimo.	Nidifica. <i>Catullo</i> .
• — <i>rubecula</i> . Lath.	Bettarello. Betàs.	Doppio Passaggio. Si fer- ma l'inverno.		Nidifica. <i>Basegg.</i> <i>Naccari</i> , e <i>Catullo</i> .
• — <i>Svecica</i> . Lath.	Coarosso foresto.	Doppio passaggio.	Piuttosto raro.	
• — <i>Tithys</i> . Scopoli.	Coarosso moro.	Comparisce in primavera.	Raro.	Nidifica. <i>Catullo</i> .
• — <i>phænicurus</i> . Lath.	Coarossa. Squarussola.	Doppio passaggio.		Nidifica. <i>Catullo</i> .
• — <i>hippolais</i> . Lath.	Boscara. Ciacolèta.	Comparisce in primavera.		Nidifica.
• — <i>sibilatrix</i> . Bechst.	Ciuin. Zaletto.	Doppio passaggio.		Nidifica.
• — <i>trochilus</i> . Lath.	Fuin. Ciuin.	id.		Nidifica.
• — <i>rufa</i> . Lath.	Ciuinetto. Papamoschin.	id.		Nidifica.
• — <i>Nattereri</i> . Temm.	Ciuin. Zaletto.	Comparisce in primavera.		
• — <i>cisticola</i> . Temm.	Czin de palù.	id.		Nidifica.
• <i>Regulus cristatus</i> . Temm.	Stellin. Repipin.	Comparisce di autunno.		
• — <i>ignicapillus</i> Temm.	Stellin. Oselin de la bella cresta.	id.		
• <i>Troglodytes vulgaris</i> . Temm.	Rozétto. Reatin. Favita.	Idem, e si ferma l'inverno.		Nidifica. <i>Naccari</i> , <i>Basegg.</i> e <i>Catul</i> .
• <i>Saxicola Oenanthe</i> . Bechst.	Cul bianco. Zopparò- lo. Culetto.	Doppio passaggio.		Nidifica. <i>Basegg.</i> e <i>Catullo</i> .
• — <i>stapazina</i> . Temm.	Favretto.			
• — <i>aurita</i> . Temm.	Battiale moro.	Comparisce in primavera.	Raro.	Nidifica. <i>Basegg.</i>
• — <i>rubetra</i> . Bechst.	Battiale. Grisùt.	Doppio passaggio.		Nidifica.
• — <i>rubicola</i> . Bechst.	Mozzétto. Battiale.	id.		Nidifica.

• <i>Accentor alpinus</i> . Bechst.	Matton. Passeramatta.	Passaggio accidentale.	Raro.	Nidifica. <i>Catullo</i> .
• — <i>modularis</i> . Cuv.	Morètta. Morettina.	Doppio passaggio.		Nidifica.
• <i>Motacilla lugubris</i> . Pallas.	Boarina.	Comparisce in primavera.	Raro.	
• — <i>alba</i> . Linn.	Boarina. Sguasseròtto.	Doppio passaggio.		Nidifica.
• — <i>boarula</i> . Linn.	Boarina. Scassacodola	id.		Nidifica.
• — <i>cinereocapilla</i> . Savi.	Boarinàto.	id.		Nidifica.
• — <i>flava</i> . Linn.	Boarina zala. Scassola.	id.		Nidifica.
• <i>Anthus Richardi</i> . Vieillot.	Tordinòn.	Passaggio accidentale di autunno.	Rarissimo.	
• — <i>aquaticus</i> . Bechst.	Fistòn.	Quasi stazionario.		Nidifica.
• — <i>rufescens</i> Temm.	Fistòn foresto.	Comparisce in primavera.	Raro.	
• — <i>pratensis</i> . Bechst.	Fista.	Doppio passaggio.		Nidifica. <i>Basegg.</i> e <i>Catullo</i> .
• — <i>rufogularis</i> . Brechm.	Fista foresta.	Passaggio accidentale.	Raro.	
• — <i>arboreus</i> . Bechst.	Tordina.	Doppio passaggio.		Nidifica. <i>Catullo</i> .

GRANIVORES.

<i>Alauda Calandra</i> . Linn.	Calandra. Calandròn.	Passaggio accidentale.	Raro.	Nidifica. <i>Naccari</i> .
• — <i>cristata</i> . Linn.	Capelù. Lodola. capelùda.	Stazionario.		Nidifica.
• — <i>alpestris</i> . Linn.	Lodola foresta.	Passaggio accidentale.	Rarissimo.	
• — <i>arvensis</i> . Linn.	Lodola.	Stazionario.		Nidifica.
• — <i>arboorea</i> . Linn.	Beluàto. Calandrin.	Doppio passaggio.		Nidifica.
• — <i>brachidactyla</i> . Temm.	Lodolin.	Passaggio accidentale.	Raro.	
• <i>Parus Major</i> Linn.	Parùssola. Sperùnzola.	Doppio passaggio.		Nidifica.
• — <i>lugubris</i> . Nater.	Parùssola foresta.	Passaggio accidentale.	Rarissimo.	
• — <i>ater</i> . Linn.	Parussola piccola o de Monte.	Passa in primavera.	Raro.	Nidifica. <i>Catullo</i> .
• — <i>cæruleus</i> . Linn.	Parussolin. Frattin.	Doppio passaggio.		Nidifica. <i>Catullo</i> .
• — <i>cristatus</i> . Linn.	Parussolinco la cresta.	Passaggio accidentale.	Raro.	
• — <i>palustris</i> . Linn.	Parussoletta capucina.	Comparisce in primavera.		
• — <i>caudatus</i> . Linn.	Cotimòn. Parussolin de la coda lunga.	Doppio passaggio.		Nidifica.
• — <i>biarmicus</i> . Linn.	Organèto. Sonèto. Ussarin. Mustachin.	id.		Nidifica.
• — <i>pendulinus</i> . Linn.	Pendolin.	Passa in primavera.		Nidifica.
• <i>Emberiza Citrinella</i> . Linn.	Squajardola. Verdolise.	Doppio passaggio.		Nidifica.
• — <i>miliaria</i> . Linn.	Brustolòn. Strilòzzo.	id.		Nidifica.
• — <i>palustris</i> . Savi.	Ciàtto de palù.	Comparisce in primavera.		Nidifica.
• — <i>pyrrhuloides</i> . Pall.	Ciàtto. Ciepp. Pionza.	Doppio passaggio.		Nidifica.
• — <i>Schoeniclus</i> Linn.	Ortolàn.	Comparisce in primavera.		Nidifica.
• — <i>hortulana</i> . Linn.	Piucà.	Passaggio accidentale.	Raro.	
• — <i>cirlus</i> . Linn.	Cio. Cip.	Passa in autunno.		Nidifica. <i>Basegg.</i>
• — <i>cia</i> . Linn.	Ciàtto foresto.	Passaggio accidentale.	Raro.	
• — <i>lesbia</i> . Gmel.	Ortolan bianco	Accidentalmente l'inverno.	Raro.	Nidifica secondo il <i>Catullo</i> .
• <i>Plectrophanes nivalis</i> . Temm.	Ortolan de la neve.			
• — <i>calcarata</i> . Temm.	Ortolàn foresto. Ortolan dei Prà.	Accidentalmente di au- tunno.	Raro.	

• <i>Loxia curvirostra</i> . Linn.	Becco in croce.	Passaggio irregolare alla fine di estate.		
• <i>Pyrrhula vulgaris</i> . Briss.	Subiòto. Finco subiòto.	Passa d'inverno.		Nidifica. <i>Catullo</i> .
• <i>Fringilla Coccythraustes</i> . Temm.	Frisòn. Sfrisòn.	Quasi stazionario.		Nidifica.
• — <i>chloris</i> . Temm.	Cerànto. Zarànto.	Stazionario.		Nidifica.
• — <i>petronia</i> . Temm.	Cèlega foresta. Cèlegòn.	Passaggio accidentale.	Raro.	
• — <i>cisalpina</i> . Temm.	Cèlega grossa. Cèlegòn. Passera.	Stazionario.		Nidifica.
• — <i>domestica</i> . Linn.	Cèlega.	Passaggio accidentale.	Rarissimo.	Nidifica secondo il <i>Naccari</i> ; ne dubito.
• — <i>montana</i> . Linn.	Celeghètta meggiarola.	Stazionario.		Nidifica.
• — <i>serinus</i> . Linn.	Frisarin. Sverzelin.	Doppio passaggio.		Nidifica. <i>Catullo</i> .
• — <i>coelebs</i> . Linn.	Finco. Fringuèl.	Quasi stazionario.		Nidifica.
• — <i>montifringilla</i> . Linn.	Montàn. Finco montàn.	Doppio passaggio.		Nidifica. <i>Catullo</i> .
• — <i>nivalis</i> . Linn.	Finco de la neve o bianco.	Passaggio accidentale.	Raro.	Nidifica. <i>Catullo</i> .
• — <i>cannabina</i> . Linn.	Faganèllo.	Doppio passaggio.		Nidifica. <i>Catullo</i> .
• — <i>montium</i> . Gmel.	Faganèllo foresto.	Passaggio accidentale in Primavera.	Raro.	
• — <i>citrinella</i> . Linn.	Verdolise.	id.	Raro.	
• — <i>Spinus</i> . Linn.	Lugarin.	Passaggio irregolare.		
• — <i>linaria</i> . Gmel.	Organin Mondono-	id.		
• — <i>rufescens</i> . Viell.	vo. Cardinalin.			
• — <i>carduelis</i> . Linn.	Gardellin. Gardèllo.	Stazionario.		Nidifica.
• — <i>canaria</i> . Linn.	Canarin.	Si propaga domestico.		

ZYGODACTYLI.

• <i>Cuculus. canorus</i> . Linn.	Cùceo. Cuccùc.	Doppio passaggio.		Nidifica.
• <i>Picus. martius</i> . Linn.	Spigòzzo de monte.	Passaggio accidentale.	Raro.	Nidifica <i>Catullo</i> .
• — <i>viridis</i> . Linn.	Spigòzzo verde. Pico.	Quasi stazionario.		Nidifica.
• — <i>varius</i> . Gmel.	Spigòzzo verde. Pico.	Passaggio accidentale.	Raro.	
• — <i>major</i> . Linn.	Spigòzzo macchià.	Stazionario.		Nidifica.
	Pico rosso.			
• — <i>minor</i> . Linn.	Spigozzèto. Pichètto.	Passaggio accidentale.	Rarissimo.	
• <i>Yunx. torquilla</i> . Linn.	Caostòrto. Formighèr.	Doppio passaggio.		Nidifica.

ANISODACTYLI.

<i>Sitta Europæa</i> . Linn.	Rovegaròlo.	Stazionario.		Nidifica.
• <i>Certhia familiaris</i> . Linn.	Rampeghin. Rapegaròlo.	id.		Nidifica.
<i>Tichodroma phenicoptera</i> Temm.	Beccasàssi. Rampeghin de monte.	Passaggio accidentale.	Raro.	Nidifica <i>Catullo</i> .
• <i>Upupa Epops</i> . Linn.	Gallètto de monte Gallètto Megiaròlo.	Comparisce in primavera.		Nidifica.

ALCYONES.

• <i>Merops apiaster</i> . Linn.	Tordo marin. Vesparòlo.	Passaggio accidentale.	Raro.	
• <i>Alcedo ispida</i> . Linn.	Piombin.	Stazionario.		Nidifica.

CHELIDONES.

• Hirundo rustica. Linn.	Sisila.	Comparisce in Primavera.	Nidifica.
— urbana. Linn.	Tartagin. Rondin.	id.	Nidifica.
• — riparia. Linn.	Rondinella	id.	Nidifica.
• — rupestris. Linn.	Rondin de monte.	Passaggio accidentale. Raro.	Nidifica. Basegio, e Catullo.
• Cypselus alpinus. Temm.	Rondòn foresto	id.	Nidifica. Catullo.
— murarius. Temm.	Rondòn bianco.	Raro.	Nidifica.
• Caprimulgus europæus. Linn.	Rondon. Sbirri.	Comparisce in Primavera.	Nidifica.
	Tettavàche. Boccàs.	id.	Nidifica.

COLUMBÆ.

• Columba palumbus. Linn.	Colombàsso. Colombo salvadego.	Doppio passaggio.	Nidifica. Catullo.
— Oenas. Linn.	Colombo Torresàn o de Colombàra.	Doppio passaggio, e si propaga domestico.	Nidifica nel bosco del Cansiglio. Catullo.
— livia. Brisson.	Colombo Salsaro.	Doppio passaggio.	
— risoria. Linn.	Tortorella de Cipro.	Si propaga domestico.	
• — turtur. Linn.	Tòrtora. Tortorella.	Comparisce in Primavera.	Nidifica.
— domestica. Gmel.	Colombo de sotto banca.	Si propaga domestico.	
— gutturosa. Linn.	Colombo del gozzo.	id.	Queste sono varietà della Col.
— laticauda. Linn.	Colombo Pavòn.	id.	domestica che
— gyatrix. Linn.	Colombo zirante.	id.	si propagano domestiche.
— hispida. Linn.	Colombo rizzo.	id.	
• — cucullata. Linn.	Colombo col capuzzo.	id.	
	Colombo capuzzin.	id.	
— turbita. Temm.	Colombo della tripèta.	id.	

GALLINÆ.

• Pavo cristatus. Linn.	Payòn. Paòn.	id.	
— idem albus Linn.	Pavon bianco.	id.	
Meleagris gallopavo. Linn.	Dindio. Pào.	id.	
Numida meleagris. Linn.	Gallina Faraòna.	id.	
Phasianus gallus. Linn.	Gallo il Maschio. Gallina la Femmina. Pollastro il Giovine. Cap- id. pòn quando è castrato.	id.	
— colchicus. Linn.	Fasàn.	id.	
— nyctemerus. Linn.	Fasàn d'arènto.	id.	
— pictus. Linn.	Fasàn dorato della China.	id.	
Tetrao Urogallus. Linn.	Gallo cedròn. Gallo de monte.	Passaggio accidentale.	Nidifica. Basegio. Catullo.
• — tetrix. Linn.	Gallo forcèllo Mas. Gallina forcèlla Fem.	id.	Nidifica. Basegio. Catullo.
— bonasia Linn.	Francolin. Gallo salvadego.	id.	Nidifica Catullo.
— lagopus. Linn.	Gallina bianca.	id.	Nidifica Catullo.
Perdix rubra. Briss.	Francolin bianco.	id.	Nidifica Catullo.
	Cotòrno.	id.	Nidifica Catullo.

Perdix saxatilis. Meyer.	Cotórno.	Passaggio accidentale.	Nidifica. <i>Catullo.</i>
— cinerea. Lath.	Pernise.	Quasi stazionario.	Nidifica.
— coturnix. Lath.	Quaggia. Quaggiotto.	id. e di doppio passaggio.	Nidifica.

ALECTORIDES.

Glareola torquata. Meyer.	Rondòn marin.	Passaggio accidentale.	Raro.
---------------------------	---------------	------------------------	-------

CURSORES.

Otix tetrax. Linn.	Gallina prataròla.	Passaggio accidentale.	Raro.
— tarda Linn.	Otarda.	id.	Rarissimo.

GRALLATORES.

Oedichnemus crepitans. Temm.	Pivaròn.	Comparisce in Primavera.	Nidifica.
Calidris arenaria. Illiger.	Pogiaròn.		
	Biseghin del Sabbion		
	Biseghin bianco.	id.	Nidifica.
	Muneghetta bianca.		
Himantopus melanopterus. Meyer.	Sgamberlo.	id.	Nidifica.
Hæmatopus ostralegus. Lin.	Caenazzo.	id.	Nidifica.
Charadrius pluvialis. Linn.	Pivaro Corridòr.	Doppio passaggio.	Nidif. di raro. <i>Cat.</i>
— morinellus. Linn.	Pivarètto.	Passaggio accidentale.	Raro.
— hiaticula. Linn.	Chiurlon. Muneghetta grossa.	Comparisce in Primavera.	Nidifica.
— minor. meyer.	Muneghetta piccola.	id.	Nidifica. <i>Catullo.</i>
— cantianus. Lath.	Muneghetta.	Doppio passaggio.	Nidifica.
Vanellus melanogaster. Bechst.	Barùsola.	Comparisce in Primavera.	
— cristatus. Meyer.	Paoncina.	Doppio passaggio.	Nidifica.
Streptilas collaris. Temm.	Paoncinetta.	Passaggio accidentale.	Raro.
Grus cinerea. Bechst.	Grùà.	Doppio passaggio.	Nidifica.
Ciconia alba. Bellon.	Sigògna bianca.	Passaggio accidentale.	Raro.
— nigra. Bellon.	Sigògna nera.	id.	Raro.
Ardea cinerea. Lath.	Sgarzo.	Quasi stazionario.	Nidifica.
— purpurea Linn.	Sgarso rosso.	Comparisce in Primavera.	Nidifica.
— egretta. Linn.	Sgarzo bianco.	id.	Nidifica. <i>Catullo.</i>
— garzetta. Linn.	Sgarzètta. Garzètta.	id.	
— stellaris. Linn.	Torobùso. Strabusino.	Quasi stazionario.	Nidifica.
— ralloides. Scop.	Guà bianco.	Passaggio accidentale	
	Corbetto bianco.	in Primavera.	Raro.
— minuta. Linn.	Trentacòste. Centocos.	Doppio passaggio.	Nidifica.
Nycticorax ardeola. Cav.	Airon. Guà.	Comparisce in Primavera.	Nidifica.
Phœnicopterus roseus Pall.	Fenicòttero.	Passaggio accidentale.	Rarissimo.
Recurvirostra avocetta. Lin.	Caleghèr. Scarpollaro.	Comparisce in Primavera.	Nidifica.
Platalea Leucorodia. Linn.	Paloto. Sculièr.	Passaggio accidentale.	Raro.
Ibis Falcinellus. Temm.	Arcasa verde.	Comparisce in Primavera	
		di passaggio accidentale.	Raro.
Numenius arquatus Lath.	Arcasa.	Doppio passaggio, e quasi stazionario.	Nidifica. <i>Catullo.</i>

• Numenius phaeopus. Lath.	Taragnòla.	Doppio passaggio.	
• — tenuirostris Viell.	Arcasèta.	Comparisce alla fine d'estate, e di raro in inverno.	Raro.
Tringa subarquata. Temm.	Biseghin rosso, o Biseghin d'istà.	Doppio passaggio.	
• — variabilis. Meyer.	Biseghin.	idem.	
• — platyrhyncha Temm.	Biseghin piccolo differente.	Comparisce in Agosto.	Raro.
• — maritima. Brunnichii.	Biseghin.	idem.	
• — minuta. Leisler.	Biseghin novèllo.	idem.	
• — temminckii. Leisler.	Biseghin piccolo.	idem.	
• — cinerea. Linn.	Tòtano bastardo.	Comparisce in Primavera.	
• Machetes pugnax. Cuvier.	Tòtano muto.	Passa a stormi in Primavera nè mai in abito di nozze.	
• Totanus fuscus. Leisler.	Tòtano.	Stazionario.	Nidifica.
• — calidris. Bechst.	Tòtano.	idem.	Nidifica.
• — stagnatilis. Bechst.	Totanèllo. Biseghin del Sabbion.	Doppio passaggio.	
• — ochropus. Temm.	Cul bianco. Pluich grosso.	idem.	
• — glareola Temm.	Totanèllo. Pluich piccolo.	idem.	
• — macularia Temm.	Totanèllo macchià.	idem.	
• — hypoleucos. Temm.	Tramontanèlla.	Comparisce alla fine di Primavera.	Nidifica.
• — glottis. Bechst.	Totanòn.	Doppio passaggio.	
• Limosa melanura. Leisler.	Vèttola.	Comparisce in Primavera.	
• — rufa. Brisson.	Vèttola.	idem.	
• Scolopax rusticola. Linn.	Gallinàzza.	Doppio passaggio.	
• — major. Linn.	Ciochètta.	Comparisce in Aprile, e Maggio, di raro in 7bre.	
• — Gallinago. Linn.	Beccanòtto.	Quasi stazionario, e di doppio passaggio.	Nidifica Catullo.
• — Brehmii. Kaup.	Beccanòtto.	Comparisce d'inverno.	Raro.
• — Gallinula. Linn.	Beccanèlla.	Doppio passaggio.	
• Rallus aquaticus. Linn.	Sforzàna.	idem.	Nidifica.
• Gallinula Crex. Lath.	Requàggio rosso.	idem.	
• — porzana. Lath.	Gerardina. Gerardèlo.	idem.	Nidifica.
• — pusilla. Bechst.	Quaggina.	idem.	
• — Baillonii. Viell.	Fiorin. Realètto.	idem.	Nidifica.
• — chloropus. Lath.	Cavalarin.	idem.	
	Fiorin. Realètto.	idem.	Nidifica Catullo.
	Viatàra. Sfògio.	idem.	Nidifica.

PINNATIPEDES.

• Fulica atra. Linn.	Fòlega. Folèga del Fàsòlo.	Doppio passaggio.	Nidifica.
• Podiceps cristatus. Lath.	Cavriòla.	idem.	
• — rubricollis. Lath.	Smerghetta. Fisolòn.	Comparisce in Primavera	
• — cornutus. Lath.	Fisolo de mar.	Doppio passaggio.	
• — auritus. Lath.	Fisolo de mar.	idem.	
• — minor. Lath.	Fisolo canariòl.	idem.	Nidifica.

PALMIPEDES.

Sterna cantiaca. Gmel.	Giagà foresto.	Comparisce d'Estate.	Raro.	
• — hirundo. Linn.	Giagà. Criola. Magna- pesce.	Doppio passaggio.		Nidifica.
• — leucoptera. Temm.	Cocalètta bastarda.	Comparisce alla fine di Primavera.	Raro.	
• — nigra. Linn.	Cocalètta nera.			
• — minuta Linn.	Ceolina. Ficca.	Doppio passaggio.		Nidifica.
	Giagà piccolo. Scagòssa.	Comparisce alla fine di Primavera.		Nidifica.
Larus glaucus. Brünn.	Cocalon. Martinasso.			Nidifica.
• — argentatus. Brunn.	Magòga.	idem.		Nidifica. Naccari.
• — marinus. Linn.	Cocalon. Martinasso.	Stazionario.		Nidifica.
• — fuscus. Linn.	Cocalon. Martinasso.	Comparisce d'Estate.		
• — Audouini. Paryauveau.	Magòga. Bào.	idem.		Nidifica. Naccari.
• — canus. Linn.	Cocal.	idem.	Raro.	
• — melanocephalus. Natter.	Magoghètta.	Doppio passaggio.		Nidifica.
• — atricilla. Linn.	Cocal a testa nera.	idem.		
• — ridibundus. Leisler.	Cocal a testa nera.	Comparisce d'Estate.		
	Cocal.	Doppio passaggio, e quasi stazionario.		Nidifica.
• — capistratus. Temm.	Cocal.	idem.		
• — minutus. Pallas.	Cocal piccolo.	Passaggio accidentale.	Raro.	
	Cocal foresto.			
• Lestris parasiticus. Boie.	Cocal nero a coalunga.	idem.	Raro.	
• — pomarinus. Temm.	Cocal nero a coalunga.	idem.	Rarissimo.	
• Puffinus anglorum. Temm.	Cotal nero foresto, o Smerghetto piccolo.	idem.	Rarissimo.	
Thalassidroma pelagica. Wilson.	Osèl de San Pièro, o de la Tempesta.	idem.	Rarissimo.	
Anser ferus. Temm.	Oca salvadega grande.	Doppio passaggio.		
• — — v. ^s domestica. Linn.	Oco. Oca mèstega.	Si propaga domestico.		
• — segetum. Temm.	Oca salvadega piccola.	Doppio passaggio.		
• — albifrons. Temm.	Oca salvadega foresta.	Passaggio accidentale.	Rarissimo.	
• — bernicla. Temm.	Oca nera foresta.	idem.	Rarissimo.	
• Cygnus musicus Temm.	Cigno salvadego.	Passaggio accidentale d'inverno.	Raro.	
	Cièsano.			
• — Olor. Temm.	Cigno domèstego.	Si propaga domestico.		
• Anas tadorna. Linn.	Chèrso.	Comparisce l'Inverno.		
• — domestica. Linn.	Anara. Arena.	Si propaga domestica con le sue varietà.		
• — moschata. Linn.	Anara dindia o de Barbaria.	Si propaga domestica.		
• — boscas. Linn.	Mazzorin il maschio.	Doppio passaggio.		Nidifica.
	Anera la femmina.			
• — strepera. Linn.	Pignòla. Pignòlo.	Comparisce da Ott. a Mar.		
• — acuta. Linn.	Asià. Collànzio. Forfe- sòn. Anara subiota.	id.		Nidifica. Naccari, e Catullo.
• — penelope. Linn.	Chiosso. Soffio il mas. Chiosètta la femmina.	id.		Nidifica. Naccari.

• <i>Anas clypeata</i> . Linn.	Fòfano. Palòto. Sculiàro.	Comparisce da Ott. a Marz.	Nidifica. <i>Naccari</i> .
• — <i>querquedula</i> . Linn.	Creccola. Rochello. Raganello.	Comparisce in primavera.	Nidifica. <i>Naccari</i> , e <i>Catullo</i> .
• — <i>crecca</i> . Linn.	Sarsègna.	Doppio passaggio.	Nidifica.
• — <i>fusca</i> . Linn.	Orco marin.	Comparisce d'inverno.	Fra i Rari.
• — <i>nigra</i> . Linn.	Orchetto marin picc.	Passaggio accidentale d'inverno.	Rarissimo.
— <i>leucocephala</i> . Lath.	Magassetto bastardo.	id.	Rarissimo.
• — <i>glacialis</i> . Linn.	Sarèna. Anara a coda lunga.	id.	Rarissimo.
• — <i>rufina</i> . Pallas.	Magàsso col zuffo.	id.	Raro.
• — <i>marila</i> . Linn.	Magassin bastardo.	Comparisce d'inverno.	
• — <i>ferina</i> . Linn.	Magàsso monàro.	id.	Nidifica. <i>Naccari</i> .
• — <i>clangula</i> . Linn.	Quattrochj. Campan.	Doppio passaggio.	Nidifica. <i>Naccari</i> .
• — <i>fuligula</i> . Linn.	Campanato. Penachin. Capellòzzo.	Comparisce d'inverno.	Nidifica. <i>Naccari</i> .
• — <i>leucophthalmos</i> . Bechst.	Caoròsso. Terziol. Magassetto rosso.	Comparisce in primavera.	
<i>Mergus merganser</i> . Linn.	Serrolòn del Pò.	Comparisce d'inverno.	Raro.
• — <i>serrator</i> . Linn.	Sèrola. Spèrga.	Doppio passaggio.	
• — <i>albellus</i> . Linn.	Anzolètto il maschio. Piscegù, Pescarin, la femmina.	Comparisce d'inverno.	
<i>Pelecanus onocrotalus</i> . Lin.	Pelican. Gròtto.	Passaggio accidentale.	Raro.
— <i>crispus</i> . Brunn.	Pelican. Gròtto.	id.	Raro.
• <i>Carbo cormoranus</i> . Meyer.	Corvo marin. Smàgo.	id.	Fra i Rari.
— <i>pygmæus</i> . Temm.	Corvetto marin forest.	id.	Rarissimo.
• <i>Colymbus glacialis</i> . Linn.	Smergo bagiante. Smergòn.	Comparisce d'inverno.	
— <i>arcticus</i> . Linn.	Smergòn. Smèrgo.	id.	Raro.
• — <i>septentrionalis</i> . Linn.	Smergo piccolo macchia.	id.	



CATALOGO degl' Insetti delle Provincie di Padova e Venezia e de' loro dintorni disposti, secondo il metodo di Latreille *Genera Crustaceorum et insectorum* Volumi 4 Parisiis et Argentorati 1806 ad 1809.

INSECTA APTERA.

LEGIO I. TETRACERA.

FAMILIA 1. ASELOTA.

- Genus.* *Asellus* vulgaris. Latr. In aquis dulcibus.
Idotea Entomon. Latr. In mari adriatico.
 — tridentata. Latreille. id.
Sphæroma cinerea. Latr. id.
Cymothoa asilus. Fabricii. id.
 — *Oestrum*. Fabr. id.
Bopyrus squillarum. Latr. In branchiis squillæ.

FAMILIA 2. ONISCIDES.

- Ligia* Italica Fab. In aquis marinis.
 — oceanica Fab. In mari adriatico.
 — oniscides. Latr. In adriatico.
Philosia muscorum. Latr. Sub muscis.
Oniscus asellus. Lin. *Porcelella*. Sub lapidibus.
Porcellio scaber. Latr. In ligno putrido.
 — lævis. Latr. id.
Armadillo vulgaris. Latr. Sub lapidibus.
 — variegatus. Latr. id.

LEGIO II. MIRIAPODA.

ORDO 1. CHILOGNATHA.

- Glomeris* ovalis. Latr. In mari adriatico.
 — limbata. Latr. Sub lapidibus.
 — pustulata. Latr. Sub saxis.
Julus terrestris. Linn. *Millèpiè*. In sabulosis humidis.
 — sabulosus. Linn. id.
Polydesmus complanatus. Latr. Sub lapidibus.
Pollyxenus lagurus. Latr. In muris, et arboribus.

ORDO 2. SYNGNATHA.

- Scutigera* araneoides. Latr. In domibus.
Scolopendra forficata Lin. *Centogambe*. Sub lapidibus.
Scolopendra morsitans. Lin. id.
 — electrica. Linnæi. id.

LEGIO III. ACERA.

FAMILIA 1. ARANEIDES.

TRIBUS 1. THERAPHOSA.

- Mygale* cæmentaria. Latr. In campis.

TRIBUS 2. ARANEA.

- Drassus* melanogester. Latr. Sub lapidibus.
 — fuscus. Latr. id.
 — ater. Latr. id.
 — relucens. Latr. id.
Segestria cellaria. Latr. In muris vetustis.
 — senoculata. Latr. *Ragno*. id.
Dysdera erythrina. Latr. Sub lapidibus.
Clubiona lapidicola. Latr. id.
 — holosericea. Latr. Sub cortice arborum.
 — atrox Latr. In muris vetustis.
Argyronata aquatica. Latr. *Ragno d'acqua*. In aquis dulcibus.
 — fimbriata. Latr. *Ragno d'acqua*. id.
Aranea labyrinthica. Linn. In sæpibus, in viis.
 — domestica. Linn. In domibus. *Ragno*.
Theridion sisiphum. Walchæner. In muris.
 — redimitum. Walck. In plantis.
 — benignum. Walk. Inter racemos.
 — tredecim-guttatum. Latr. In campis.
Scytoides thoracica. Walk. In domibus.
Pholcus phalangioides. Walk. id.
Linyphia triangularis. Walk. In sæpibus.
Tetragnathe extensa. Walk. In locis humidis.
Epeira umbraticola. Walk. In umbrosis.
 — diadema. Walk. In hortis.
 — fasciata Walk. In locis humidis.
 — sericea. Walk. id.
 — cucurbitina. Walk. In plantis.
 — calophylla. Walk. In ædificiis.
 — conica. Walk. In sylvis.
Thomisus citreus. Walk. In floribus.
 — cristatus. Walk. In hortis, et arvis.
 — tigrinus. Walk. In arboribus.
Micrommata Smaragdina. Latr. *Ragno verde*. In nemoribus.
Dalomedes mirabilis. Walck. In sylvis.
 — marginatus. Walck. In locis aquaticis.
Lycosa ruricola. Walck. In locis paludosis.
 — saccata. Walck. In hortis.
Eresus cinnaberinus. Walk. In agris.
Salticus scenicus. Latr. In muris.
 — Sloanii. Latr. in hortis, et agris.
 — Rumphii Latr. In truncis arborum.
 — formicarius. Latr. In plantis, et muris.

FAMILIA 2. PEDIPALPES. *Nullus.*

FAMILIA 3. SCORPIONIDES.

Scorpio europæus. Linn. *Scorpion.* In domibus.
Chelifer cancroides. Latr. In libris, et in umbrosis.
 — *cimicoides.* Latr. Sub arborum cortice.

FAMILIA 4. PHALANGITA.

Phalangium Opilio. Linn. In plantis, et muris.
Trogulus Nepaeformis. Latr. Sub lapidibus.
Siro rubens. Latr. Ad radices arborum.

FAMILIA 5. PYCNOGONIDES.

Pycnogonum Balænarum. Fab. Sub lapidibus marinis.

FAMILIA 6. ACARIDÆ.

Trombidium holosericeum. Fabricii. In cortice arborum.
Erythræus phalangioides. Latr. In humo.
Gamasus coleopratorum. Latr. In Scarabæis.
 — *Gallinæ.* Latr. *Peocchio pollin.* In gallo domestico.
 — *marginatus.* Latr. Sub lapidibus.
Oribata geniculata. Latr. id.
 — *alata.* Latr. Sub arborum cortice.
 — *humeralis.* Latr. id.
 — *horrida.* Latr. id. *Raro.*
Acarus domesticus. Latr. In caseo.
 — *Farinæ.* Latr. In farina diutius asservata.
 — *globator.* Latr. id.

FAMILIA 7. RICINLE.

Sarcoptes passerinus. Latr. In avibus.
 — *scabiei.* Latr. In scabiei ulceribus.
Cheyletus eruditus. Latr. In libris, et musæis.
Bdella rubra. Lamarck. Sub lapidibus.
Argas reflexus. Latr. In columbis.
Ixodes ricinus. Latr. In sylvis, canibus infestus.
 — *sanguineus.* Latr. In plantis.
 — *reticulatus.* Latr. id.
Uropoda vegetans. Latr. In insectis.

FAMILIA 8. HYDRACHNELLE.

Eylais extendens. Lam. In aquis stagnantibus.
Hydrachne geographica. Müller. id.
 — *cruenta.* Müll. id.
Limnochares holosericea. Latr. id.

FAMILIA 9. MICROPTIRA.

Caris vespertilionis. Latr. In vespertilionibus.
Leptus phalangii. Latr. In Phalangio Opilione.
 — *autumnalis.* Latr. In animalibus.
Astoma parasiticum. Latr. In muscis.

LEGIO IV.APTERODICERA.

ORDO 1. THYSANOURA.

FAMILIA 1. LEPISMENÆ.

Lepisma saccharina. Lin. In domibus, et fenestris.
Machilis polypoda. Latr. In plantis.

FAMILIA 2. PODURELLÆ.

Podura aquatica. Linn. In aquosis.
 — *finetaria.* Linn. In terra.
 — *plumbea.* Linn. sub lapidibus.
Smynthurus fuscus. Latr. In terra.
 — *viridis.* Latr. In plantis.

ORDO 2. PARASITA.

Ricinus cornicis. Latr. In corvo cornice.
 — *picae.* Linn. In corvo pica.
 — *Tinnunculi.* Linn. In falco tinnunculo.
 — *Buteonis.* Linn. In falco buteone.
Ricinus strigis. Linn. In strigis.
 — *orioli.* Linn. In oriolis.
 — *cuculi.* Linn. In cuculis.
 — *cygni.* Linn. In cygno.
 — *anseris.* Linn. In anseres.
 — *querquedulae.* Linn. In querquedulais.
 — *mergi.* Linn. In mergis.
 — *sternæ.* Linn. In sternis. laris.
 — *plataleæ.* Linn. In leucorodiis.
 — *ardeæ.* Linn. In ardeis.
 — *charadrii.* Linn. In pluvialibus.
 — *fulicæ.* Linn. In fulica atra.
 — *recurvirostræ.* Linn. In recurvirostris.
 — *hæmatopodis.* Linn. In hæmatopis.
 — *meleagridis.* Linn. In gallo pavonibus.
 — *columbæ.* Linn. In columbis.
 — *emberizæ.* Linn. In emberizis.
 — *pari.* Linn. In paris.
 — *motacillæ.* Linn. In motacillis.
 — *hirundinis.* Linn. In hirundine.
 — *muscoli.* Linn. In mure musculo.
 — *anatis.* Linn. In anatibus.
 — *alaudæ.* Linn. In alauda arvense.
 — *sturni.* Linn. In sturno vulgari.
 — *pyrrulæ.* Linn. In loxia pyrrhula.
 — *chloridis.* Linn. In loxia chloride.
 — *citrinellæ.* Linn. In emberiza citrinella.
 — *currucae.* Linn. In motacilla curruca.
 — *rubeculæ.* Linn. In motacilla rubecula.
 — *moschatae.* Linn. In anate moschata.
 — *gruis.* Linn. In gruibus.
 — *ciconiæ.* Linn. In ciconiis.

- Ricinus pavonis*. Linn. In pavonibus.
 — *caponis*. Linn. In gallinis domesticis.
 — *tetraonis*. Linn. In tetraonibus.
 — *lagopi*. Linn. In lagopo.
 — *fringillæ*. Linn. In fringillis.
 — *phasiani*. Linn. In phasiano.
 — *curvirostræ*. Linn. In *loxia curvirostra*.
Pediculus humanus. Linn. *Peochio*. In hominis cute.
 — *cervicalis*. Latr. In cervice hominis.
 — *pubis*. Linn. *Piattola*. In pube, et superciliis hominum.
 — *tabescentium*. Alt. In Phthiriasis hominis.
 — *suis*. Linn. In suis.
 — *ovis*. Linn. In ovibus.
 — *bovis*. Linn. In bobus.
 — *vituli*. Linn. id.
 — *equi*. Linn. In equis.
 — *asini*. Linn. In asinis.

INSECTA ALATA.

LEGIO V. PTERODICERA.

CENTURIA PRIMA. ELYTROPTERA.

COHORS PRIMA. ODONTATA.

SECTIO PRIMA.

ORDO PRIMUS. COLEOPTERA.

TRIBUS PRIMA. ENTOMOPHAGI.

FAMILIA 1. CICINDELETÆ.

- Cicindela campestris*. Linn. In sabulosis.
 — *hybrida*. Linn. id.
 — *sylvatica*. Linn. In sylvis.
 — *flexuosa*. Fab. In agris.
 — *germanica*. Fab. id.
 — *litoralis*. Dejan. Ad litora maris.
 — *discors*. Megerle. In agris.
 — *maura*. Fab. Ad litora maris.
 — *sylvicola*. Meg. In sylvis.
 — *sinuata*. Fab. Ad litora maris.
 — *trisignata*. Illiger. Id.

FAMILIA 2. CARABICI.

STIRPS PRIMA. ELAPHRII.

- Elaphrus riparius*. Fab. In sabulosis aquaticis.
 — *uliginosus*. Fab. In locis humentibus. *Raro*.
 — *cupreus*. Dufresn. In agris.
 — *litoralis*. Meg. Ad litora. *Raro*.
Bembidion flavipes. Latr. In sabulosis.
 — *riparium*. Latr. In locis humidis.
 — *rupestre*. Latr. Sub lapidibus.
 — *litorale*. Latr. In sabulosis.

- Bembidion impressum*. Panzer. In sabulosis.
 — *decorum*. Latr. id.
 — *foraminosum*. Meg. id.
 — *pygmæum*. Latr. id.
 — *decorum*. Zenck. id.
 — *minutum*. Gyllh. id.
 — *humerale*. Nees. id.
 — *modestum*. Perrolari. id.
 — *paludosum*. Panz. id.
 — *quadriguttatum*. Des. id.
Trechus meridianus. Clairville. In campis.
 — *rubens*. Clairv. Sub lapidibus.

STIRPS SECUNDA. GRAPHIPTERIDES. *Nullus*.

STIRPS TERTIA. CREPITANTES.

- Brachinus sclopeta*. Fab. Sub lapidibus.
 — *crepitans*. Fab. id.
Cymindis humeralis. Latr. In ligno putrescente.
Lebia cyanocephala. Latr. Sub cortice arborum.
 — *crux minor*. Latr. In hortis.
 — *chlorocephala*. Gyll. Sub lapidibus.
 — *cyanocephala*. Fab. id.
 — *atricapilla*. Latr. Sub cortice arborum.
 — *quadrimaculata*. Latr. id.
 — *truncatella*. Latr. In quisquiliis.
Odacantha melanura. Fab. Sub lapidibus.

STIRPS QUARTA. LONGOPALPATI.

- Drypta emarginata*. Fab. Sub lapidibus.
Calathus cistelloides. Bonelli. id.
Zuphium olens. Latr. In agris. *Raro*.
 — *fasciolatus*. Latr. id. *Raro*.

STIRPS QUINTA. MELANCHLÆNI.

- Agonum viduum*. Bon. Sub lapidibus.
 — *vinearum*. Bon. id.
Licinus emarginatus. Latr. In arvis.
 — *cassideus*. Latr. id. *Raro*.
 — *agricola*. Latr. id.
 — *sylphoides*. Latr. In sylvis.
 — *bipustulatus*. Latr. Sub cortice arborum. *Raro*.
Harpalus leucophthalmos. Latr. In Sylvis.
 — *vaporariorum*. Latr. Sub lapidibus.
 — *melanocephalus*. Latr. id.
 — *pumicatus*. Latr. id. *Raro*.
 — *prasinus*. Latr. id.
 — *sempunctatus*. Latr. id.
 — *marginatus*. Latr. id.
 — *flavicornis*. Latr. id.
 — *ruficornis*. Latr. id.
 — *niger*. Latr. id.
 — *striola*. Latr. id.

Harpalus cistelloides. Latr. Sub lapidibus.

- tardus. Latr. In campis.
- lepidus. Latr. id.
- aeneus. Latr. id.
- holosericeus. Latr. id.
- distinguendus. Dust. id.
- fuscus. Latr. id.
- honestus. And. id.
- cupreus. Latr. id.
- limbatus. Dust. Sub lapidibus.
- germanus. Latr. id.
- Megerlei. De Cristof. id.
- helopioides. Latr. id.
- opacus. De Cristof. id.
- picipennis. Meg. id.
- strenuus. Latr. id.
- vernalis. Latr. id.
- subcyaneus. Illig. In campis.
- puncticollis. Latr. Sub lapidibus.
- alpinus. Latr. In euganeis. id.
- bombycinus. Bonel. id.
- Frischii. Latr. id.
- megacephalus. Latr. id.
- viduus. Latr. id.
- oblongopunctatus. Latr. id.
- chlorophanus. Bonel. In campis.
- sabulicola. Bonel. id.
- chrysocephalus. Latr. Sub lapidibus.
- impiger. Latr. id.
- latus. Latr. id.
- Paecilus communis. Bonel. id.
- vulgaris. Bonel. id.
- Percus melanarius. Bonel. id. *Raro.*

STIRPS SEXTA. FOSSORES.

- Scarites arenarius. Dej. Ad littora maris.
- litoralis. Creutz. id.
- terricola. Bonel. Sub lapidibus.
- Clivina arenaria. Latr. In sabulosis humidis.

STIRPS SEPTIMA. METALLICI.

- Cychrus rostratus. Fab. Sub lapidibus.
- italicus. Bonel. id.
- angustatus. Hop. id.
- Calosoma sycophanta. Fab. In sylvis.
- inquisitor. Fab. id.
- Carabus coriaceus. Linn. Euganeis. sub lapidibus.
- auratus. Linn. In campis.
- violaceus. Linn. id.
- catenulatus. Fab. In sylvis euganeis.
- purpurascens. Fab. Sub lapidibus.
- granulatus. Linn. id.

Carabus alpinus. Bonel. In euganeis id.

- alyssidotus. Ill. Sub lapidibus. id.
- piceus. Panz. id. *Raro.*
- arvensis. Fab. id.
- auronitens. Fab. id. in euganeis.
- Bonellii. Sturm. id.
- cancellatus. Fab. id.
- nigricornis. Fab. id.
- aulicus. Fab. id. *Raro.*
- cupreus. Fab. id.
- Creutzeri. Fab. In euganeis.
- cyaneus. Fab. Sub lapidibus.
- Germari. Sturm. In euganeis. *Raro.*
- glabratus. Fab. Sub lapidibus.
- assimilis. Sturm. In euganeis.
- Italicus. Dej. id.
- clathratus. Fab. Sub lapidibus.
- monilis. Fab. id. In euganeis.
- sylvestris. Fab. id.
- morbillosus. Latr. id.

Panagæus crux major. Latr. In sylvis.

STIRPS OCTAVA. BARBATE.

- Nebria arenaria. Latr. In sabulosis maritimis.
- brevicollis. Latr. Sub lapidibus.
- multipunctata. Latr. In sylvis.
- picicornis. Latr. Sub lapidibus.
- psammodes. Rossi. id.
- Pogonophorus cæruleus. Latr. Sub cortice arborum.
- rufescens. Latr. id.
- Loricera aenea. Latr. Sub lapidibus.
- Omopron limbatus. Latr. In sabulosis humidis.

FAMILIA 3. HYDROCANTHARI.

- Dytiscus marginalis. Linn. In aquis fossarum.
- bipustulatus. Linn. id.
- Roeselii. Fab. id.
- lacustris. Fab. id.
- sulcatus. Fab. id.
- Hybneri. Fab. id.
- fenestratus. Fab. Ad littora maris in fucis.
- serricornis. Paykull. In aquis dulcibus.
- dolabratus. Panz. id.
- paludosus. Latr. id.
- semistriatus. Linn. id.
- Hyphydrus ferrugineus. Latr. id.
- Noterus crassicornis. Clairv. id.
- Haliplus impressus. Latr. id.
- Hydrachna ovalis. Fab. id.
- Hydroporus geminus. Fab. In aquis stagnantibus.
- minutus. Fab. id.
- parvulus. Fab. id.

Idroporus areolatus. Fab. In aquis stagnantibus.

TRIBUS SECUNDA. SAPROPHAGI.

FAMILIA 4. STERNOXI.

- Buprestis novem-maculata*. Linn. In dumetis.
 — *tenebrionis*. Linn. In pruno spinosa.
 — *chrysostigma*. Linn. In arboribus.
 — *minuta*. Linn. In foliis ulmi.
 — *ænea*. Linn. In arboribus.
 — *cariosa*. Fab. id. In euganeis.
 — *hyperici*. Creutz. In hyperico.
 — *6. maculata*. Latr. In arboribus.
 — *foveolata*. Herbst. id.
 — *4. maculata*. Fab. id.
 — *læta*. Fab. id.
 — *elata*. Fab. id.
 — *cœrulea*. Latr. In nemoribus.
 — *manca*. Fab. id.
 — *serricornis*. Meg. id.
 — *mariana*. Fab. In euganeis.
 — *morio*. Payk. In arboribus.
 — *octoguttata*. Linn. In nemoribus.
 — *rubi* Fab. In rubo.
 — *salicis*. Fab. In salice.
 — *tæniata*. Fab. In floribus.
 — *viridis*. Fab. In betula.
 — *rustica*. Linn. In nemoribus.
 — *nitidula* Fab. id.
Elater ferrugineus. Linn. *Salta martini*. In arboribus.
 — *castaneus*. Linn. In sylvis.
 — *murinus*. Linn. In hortis.
 — *marginatus*. Linn. In plantis.
 — *æneus*. Fab. In hortis.
 — *aterrimus*. Fab. id.
 — *atomarius*. Fab. In floribus.
 — *bimaculatus*. Fab. id.
 — *bipustulatus*. Fab. id.
 — *cruciatus*. Fab. In floribus. *Raro*.
 — *obscurus*. Fab. In hortis.
 — *cupreus*. Fab. id.
 — *analis*. Fab. In floribus.
 — *filiformis*. Fab. In hortis.
 — *hæmorrhoidalis*. Fab. id.
 — *holosericeus*. Fab. In floribus.
 — *germanus*. Will. id.
 — *longicollis*. Fab. id.
 — *striatus*. Fab. id.
 — *nitidicollis*. Meg. id.
 — *fugax*. Fab. id.
 — *nigricornis*. Will. In hortis.
 — *pectinicornis*. Fab. id.

- Elater præustus*. Fab. In sylvis.
 — *pulchellus*. Fab. In sabulosis, hortis.
 — *4. maculatus* Fab. id.
 — *ruficollis*. Fab. In graminosis.
 — *rufipes*. Fab. In floribus.
 — *sanguineus*. Fab. In hortis.
 — *æruginosus*. Fab. In plantis.
 — *hirtus*. Will. id.
 — *hæmatodes*. Fab. In floribus.
 — *tesselatus*. Fab. In hortis.
 — *vittatus*. Fab. In floribus.
 — *limbatus*. Fab. id.
 — *piceus*. Meg. id.
 — *niger* Fab. In hortis.
 — *sputator*. Fab. id.
 — *minutus*. Fab. In sabulosis humidis.
Cebrio gigas. Fab. In sylvis.

FAMILIA 5. MALACODERMI.

- Dascillus cervinus*. Latr. In floribus.
Elodes pallida. Latr. In locis humidis.
 — *phellandrii*. Latr. id.
Drilus flavescens. Oliv. In plantis.
Lycus rufipennis. Latr. In floribus.
Lampyris splendidula. Linn. *Battisessola*, *Lusariola*.
 In hortis.
 — *italica* Linn. In pratis.
 — *noctiluca*. Fab. id.
Telephorus fuscus. Schæffer. In hortis.
 — *melanurus*. Latr. id.
 — *lividus*. Oliv. In euganeis.
 — *dispar*. Latr. id.
 — *nigricans*. Oliv. id.
 — *bicolor*. Latr. id.
 — *obscurus*. Oliv. id.
 — *pallidus*. Oliv. id.
 — *bipunctatus*. Latr. id.
 — *clypeatus*. Latr. In plantis. *Raro*.
 — *testaceus*. Oliv. In hortis.
Malthinus ruficollis. Latr. In sæpibus.
 — *marginatus*. Latr. In plantis.
 — *collaris*. Latr. id.
 — *flavus*. Latr. id.
 — *biguttulus*. Payk. id.
 — *pallidicollis*. Meg. id.
 — *thoracicus*. Meg. id.
Dasytes ater. Fab. In graminibus.
 — *linearis* Fab. In plantis.
 — *cæruleus*. Fab. id.
 — *bipustulatus*. Fab. id.
 — *4. pustulatus*. Fab. id.

Dasytes plumbeus. Oliv. In plantis.
Malachius æneus. Fabr. In hortis.
 — *elegans*. Fab. id.
 — *bipustulatus*. Fab. id.
 — *equestris*. Fab. id.
 — *flavipes*. Fab. id.
 — *rufipes*. Fab. id.
 — *marginellus*. Fab. id.
 — *ruficollis*. Fab. id.
 — *pulicarius*. Fab. id.
Hylecætus dermestoides. Latr. In lignis vetustis.
Lymexylon navale. Fab. In arboribus.

FAMILIA SEXTA. CLERIL.

Tillus elongatus. Fab. In arboribus vetustis.
 — *unifasciatus*. Latr. id.
Thanesimus formicarius. Latr. In arboribus.
 — *mutillarius*. Latr. id.
Enoplium serraticorne. Latr. In domibus.
Opilo mollis. Latr. Sub arborum cortice.
 — *hirtellus*. Latr. id.
Clerus alvearius. Latr. In floribus umbellatis.
 — *apiarius*. Latr. id.
Necrobia violacea. Latr. In lardis asservatis.
 — *rufipes*. Latr. id.

FAMILIA SEPTIMA. PTINIORES.

Anobium tessellatum. Fab. In arboribus vetustis.
 — *molle*. Fab. In domibus.
 — *striatum*. Oliv. id.
 — *castaneum*. Fab. id.
 — *paniceum*. Fab. In pane diutius asservato.
 — *pertinax*. Fab. *Cariol.* In lignis vetustis.
 — *reticulatum*. Fab. id.
 — *villosum*. Bon. id.
 — *rufipes*. Gyllh. id.
Ptilinus pectinicornis. Fab. id.
Gibbium scotias. Latr. In domibus, musæis.
Ptinus fur. Linn. id.
 — *imperialis*. Fab. id.
 — *italicus*. Chevrol. id.
 — *latro*. Fab. id.
 — *testaceus*. Oliv. id.
 — *germanus*. Fab. id.
 — *iuglandis*. Panz. In iuglande.

FAMILIA OCTAVA. PALPATORES.

Scydmaenus Hellwigii. Latr. In sabulosis humidis.

FAMILIA NONA. STAPHYLINII.

Oxyporus rufus. Fab. In boletis.
Astrapæus ulmi. Gravenhorst. Sub ulmi cortice.

Staphylinus hirtus. Linn. In cadaveribus.
 — *erythropterus*. Linn. In fimo.
 — *politus*. Fab. In fimetis.
 — *molochinus*. Grav. id.
 — *fossor*. Fab. Sub lapidibus.
 — *maxillosus*. Fab. In sylvis.
 — *xantholoma*. Grav. id.
 — *olens*. Fab. In cadaveribus.
 — *nebulosus*. Fab. In fimo.
 — *cyaneus*. Fab. id.
 — *pubescens*. Fab. id.
 — *limbatus*. Sturm. id.
 — *murinus*. Fab. id.
 — *splendens*. Grav. id.
 — *æneicollis*. Dhl. id.
 — *impressus*. Grav. id.
 — *rufipennis*. Grav. id.
 — *picipennis*. Fab. id.
Lathrobium elongatum. Grav. In plantis putridis.
Pæderus angustatus. Payk. Sub lapidibus.
 — *riparius*. Fab. In sabulosis humidis.
 — *bicolor*. Grav. id.
 — *litoralis*. Grav. id.
 — *ruficollis*. Grav. id.
Stenus biguttatus. Latr. Sub lapidibus.
 — *binotatus*. Grav. id.
 — *juno*. Payk. In sabulosis humidis.
 — *oculatus*. Grav. id.
 — *geniculatus*. Grav. id.
Oxytelus carinatus. Grav. id.
 — *cornutus*. Grav. id. *Raro*.
 — *corticinus*. Grav. In fungis putridis.
 — *morsitans*. Grav. Sub lapidibus.
Proteinus brachypterus. Latr. id. *Raro*.
Tachinus rufipes. Latr. In excrementis bovinis.
Tachyporus chrysomelinus. Grav. In floribus.
 — *fimetarius*. Grav. In fimo.
 — *humeralis*. Grav. In floribus.
 — *rufipennis*. Grav. In floribus.
 — *marginatus*. Grav. id.
 — *subterraneus*. Grav. Sub lapidibus.
Aleochara bipunctata. Grav. In fimo.
 — *picea*. Grav. id.
 — *fuscipes*. Grav. id.
 — *canaliculata*. Grav. In quisquiliis.
 — *impressa*. Grav. In agaricis.

FAMILIA DECIMA. NECROFAGI.

STIRPS PRIMA. SILPHALES.

Necrophorus vespillo. Fab. Cadavera sepeliens.
 — *germanicus*. Fab. id.
 — *humator*. Fab. id.

Necrophorus mortuorum. Fab. Cadavere sepeliens.
 Silpha litoralis. Linn. In cadaveribus.
 — thoracica. Linn. id.
 — obscura. Linn. id.
 — gibba. Meg. id.
 — reticulata. Fab. id.
 — rugosa Fab. id.
 — lævigata. Fab. In sylvis.
 — atrata. Fab. In agris.
 — sinuata. Fab. id.

STIRPS SECUNDA. NITIDULARIÆ.

Thymalus ferrugineus. Latr. Sub arborum cortice.
 Nitidula linearis. Latr. id.
 — bipustulata. Fab. In lardo, et cadaveribus.
 — ænea. Fab. In floribus.
 — decemguttata Fab. id.
 — obscura. Fab. id.
 — obsoleta. Fab. In plantis.
 — varia. Fab. id.
 — solida. Illig. id.
 Cercus pedicularius. Latr. In floribus.
 — pulicarius. Latr. id.
 — urticæ. Latr. In urtica.
 Dacne rufifrons. Latr. Sub arborum cortice.
 — humeralis. Latr. id.
 Ips ferruginea. Fab. In boletis.

STIRPS TERTIA. SCAPHIDILIA.

Scaphidium agaricinum. Panz. In fungis.
 — 4. maculatum. Fab. id.
 Agyrtes castaneus. Frölich. In Boletis.
 Choleva testacea. Latr. In quisquiliis.
 — fornicata. De Geer. id.

STIRPS QUARTA. DERMESTINI.

Dermestes lardarius. Linn. In carnibus. Lardis.
 — vulpinus. Fab. In musæis.
 — murinus. Linn. In cadaveribus.
 — tessellatus. Fab. id.
 — pellio. Linn. In pellitiis.
 — bicolor. Fab. In domibus.

FAMILIA UNDECIMA. BYRRHI.

Magatoma rufitarsis. Herbst. In plantis.
 — undatum. Herbst. In floribus.
 — Schæfferi. Herbst. id.
 — serra. Herbst. In domibus.
 Attagenus megatoma. Latr. id.
 Throscus dermestoides. Latr. In plantis.
 — adstrictor. Latr. id.
 Anthrenus scrophulariæ. Fab. In scrophularia.

Anthrenus varius. Fab. In floribus.
 — museorum. Fab. In museis.
 Byrrhus pillula. Linn. Sub lapidibus.
 — nitens. Fab. In arenosis.
 Nosodendron fasciculare. Latr. In plantis vetustis.
 Hister unicolor. Linn. In stercore.
 — æneus. Fab. id.
 — bimaculatus. Fab. In stercore bovino.
 — cadaverinus. Payk. In cadaveribus.
 — fimetarius Herbst. id.
 — sinuatus. Fab. id.
 — inæqualis. Fab. id.
 — nitidulus. Fab. In stercore.
 — merdarius. Payk. id.
 — 4. maculatus. Payk. id.
 — pygmæus. Fab. id.
 — semistriatus. Jurin. Ad litora in cadaveribus.
 — glabratus. Panz. id.
 — stercorarius. Herbst. In stercore.
 — transversalis. Dfs. In cadaveribus.
 Hister duodecim striatus. Payk. In cadaveribus.
 — minutus. Fab. In boletis.
 Elmis Mangetii. Latr. In rivulis sub lapidibus. *Raro.*
 — Volkmar. Latr. id. *Raro.*

FAMILIA 12. OTIOPHORI.

Dryops auriculatus. Oliv. In rivulis sub lapidibus.
 Macronychus 4. tuberculatus. Müll. Cont. In aquis
 currentibus. *Raro.*
 Gyrinus natator. Fab. Super aquas fossarum girans.
 — villosus. Fab. id. *Raro.*

FAMILIA 13. HYDROPHILI.

Hydrophilus piceus. Fab. In aquis stagnantibus dul-
 cibus.
 — caraboides Fab. id.
 — bipunctatus. Fab. id.
 — griseus. Fab. id.
 — chrysomelinus. Fab. id.
 — seminulum. Fab. id.
 — signaticollis. Meg. id.
 Elophorus aquaticus. Fab. id.
 Hydræna riparia. Illig. id.

FAMILIA 14. SPHÆRIDOTA.

Sphæridium scarabæoides. Fab. In stercore.
 — hæmorrhoidale. Fab. id.
 — humerale. Panz. id.
 — bipustulatum. Fab. id.
 — marginatum. Fab. id.
 — unipunctatum. Fab. id.

FAMILIA 15. COPROPHAGI.

- Copris lunaris. Fab. In stercore.
 Ateuchus sacer. Fab. In euganeis. id. *Raro*.
 — volvens. Fab. id.
 — semipunctatus. Fab. In litore ad stercorea.
 Sisyphus Schæfferi. Latr. id.
 Onitis bison. Fab. In stercore. *Raro*.
 Onthophagus flavipes. Latr. id. *Raro*.
 — nutans. Latr. id.
 — vacca. Latr. id.
 — cænobita. Latr. id. *Raro*.
 — fracticornis. Latr. In stercore.
 — nuchicornis. Latr. id.
 — capra. Fab. id. *Raro*.
 — furcatus. Fab. id.
 — xyphias. Fab. id. *Raro*.
 — Schreiberi. Fab. id.
 — anachoreta. Fab. id.
 — ovatus. Fab. id.
 — scrophia. Fab. id. *Raro*.
 Aphodius rufipes. Fab. id.
 — fimetarius. Fab. id.
 — sulcatus. Fab. In viis primo vere. *Raro*.
 — bimaculatus. Fab. In stercore.
 — spurcatus. Fab. id.
 — sphacellatus. Panz. id.
 — limbatus. Ziegl. id.
 — sulcicollis. Fab. Ad vias in stercore.
 — fæstens. Fab. In stercore.
 — fœtidus. Fab. id.
 — fossor. Fab. id.
 — hæmorrhoidalis. Fab. id.
 — inquinatus. Fab. id.
 — lugens. Dufr. id.
 — merdarius. Fab. id.
 — luridus. Fab. id.
 — nitidulus. Fab. id.
 — porcatus. Fab. id.
 — porcus. Fab. id. *Raro*.
 — hispidus. Fab. id.
 — quadrimaculatus. Fab. id.
 — scrutator. Fab. id.
 — sordidus. Fab. id.
 — subterraneus. Fab. id.
 — terrestris. Fab. Ad vias in stercore.
 — atomarius. Fab. In stercore.
 — arenarius. Fab. In arenosis.
 — sus. Fab. In stercore. *Raro*.
 — asper. Fab. In stercore.
 — cæsus. Fab. id.

FAMILIA 16. GEOTRUPINI.

- Geotrupes stercorarius. Latr. In stercore.
 — vernalis. Latr. In pratis.
 — sylvaticus. Latr. In stercore.
 — mobilicornis. Fab. id. *Raro*.

FAMILIA 17. SCARABÆIDES.

- Trox sabulosus. Fab. In sabulosis.
 — arenarius. Fab. id.
 — hispidus. Fab. id.
 Sinodendron cylindricum. Fab. In truncis vetustis.
 Oryctes nasicornis. Illig. In ligno pulverulento putrido.
 — Silenus. Fab. Ad litora rejectus. *Raro*.
 Scarabæus punctatus. Villers. Ad vias.
 Melolontha vulgaris. Fab. Bozzorni. Matton. In arboribus.
 — villosa. Fab. In arboretis ad litus.
 — pilosa. Fab. id.
 — hippocastani. Panz. In hippocastano.
 — solstitialis. Fab. In pratis.
 — fullo. Fab. In sylvis euganeis. *Raro*.
 — æstiva. Latr. In arboribus.
 — variabilis. Fab. In vite.
 — vitis. Fab. id.
 — Frischii. Fab. id.
 — ruricola. Fab. In floribus.
 — horticola. Fab. id.
 — pagana. Oliv. id. *Raro*.
 — graminicola. Fab. In graminaceis.
 — brunnea. Fab. id.
 — agricola. Fab. id.
 — fruticola. Fab. In floribus.
 Hoplia philanthus. Latr. In arboretis.
 — formosa. Latr. id.
 — squamosa. Latr. id.
 Amphicoma abdominalis. Latr. In floribus.
 Trichius eremita. Fab. In arborum truncis.
 — nobilis. Fab. In floribus.
 — fasciatus. Fab. id.
 — hæmipterus. Fab. id.
 Cetonia fastuosa. Fab. id.
 — metallica. Fab. id.
 — aurata. Fab. Mosca d'oro. id.
 — viridis. Fab. In vite.
 — pisana. Dahl. In floribus.
 — stictica. Fab. id.
 — hirta. Fab. id.
 — marmorata. Fab. id.
 — ænea Gyll. id.
 — obscura. Fab. id. *Raro*.

Cetonia morio. Fab. *Apibus infesta*.
— *oblonga*. Dej. In vite.

FAMILIA 18. LUCANIDES.

Platycerus parallelipedus. Latr. In sylvis.
— *caraboides*. Latr. In sylvis euganeis.
Lucanus cervus. Linn. *Cervo volante*. id.
— *capreolus*. Linn. id. *Raro*.

SECTIO SECUNDA. HETEROMERES.

TRIBUS PRIMA. NUBILI.

DIVISIO PRIMA. SABULOSI.

FAMILIA 19. PIMELIARIE.

Pimelia bipunctata. Fab. In arenosis humidis. *Raro*.
— *muricata* Fab. id. *Raro*.
Tagenia filiformis. Latr. id.
Asida grisea. Latr. In sabulosis humidis.

FAMILIA 20. TENEBRIONITES.

Scaurus striatus. Fab. In sabulosis humidis. *Raro*.
Blaps mortisaga. Fab. *Schiavo*. In suffocatis domorum.
— *gages*. Fab. id.
— *similis*. Latr. id.
Opatrum sabulosum. Fab. In sabulosis.
— *arenarium*. Fab. id.
Tenebrio molitor. Linn. *Tarma* larva ejus. In domibus.
— *curvipes*. Fab. *Schiavo*. id.
— *obscurus*. Fab. id.

FAMILIA 21. DIAPERIALES.

Hypophlæus castaneus. Fab. Sub cortice hulmi.
Phalæria cadaverina. Fab. Ad litus in cadaveribus.
Diaperis boleti. Fab. In boletis arborum.
Eledona agaricicola. Latr. id.

FAMILIA 22. HELOPH.

Helops lanipes. Fab. Sub cortice arborum.
— *ater*. Fab. id.
— *quisquilius*. Fab. In quisquiliis.
Orchesia micans. Latr. In fungis.
Pytho cœruleus. Fab. Sub arborum cortice.
Lagria hirta. Fab. In plantis, et pratis.

FAMILIA 23. PYROCHROIDES.

Notoxus monoceros. Illig. In plantis. *Raro*.
Pyrochroa rubens. Latr. In sylvis euganeis. *Raro*.

FAMILIA 24. MORDELLONE.

Ripiphorus flabellatus. Fab. In sylvis. *Raro*.
— *bimaculatus*. Fab. id. *Raro*.
— *paradoxus*. Fab. In floribus. *Raro*.
Mordella aculeata. Linn. id.

Mordella fasciata. Fab. In floribus.
Anaspis frontalis. Latr. id.
— *flava*. Fab. id.
— *humeralis*. Fab. id. *Raro*.

FAMILIA 25. HORIALES. Nullus.

FAMILIA 26. CANTHARIDIE.

Cerocoma Schæfferi. Fab. In segetibus. *Raro*.
Mylabris 10-punctata. Fab. In floribus.
— *spartii*. Germ. id. *Raro*.
— *Fuesslini*. Panz. id. *Raro*.
Meloe proscarabæus. Linn. In pratis in vere.
— *punctata*. Fab. In pratis arenosis.
— *majalis*. Fab. id.
Cantharis vescicatoria. Latr. In fraxino.
— *verticalis*. Illig. In plantis.
Sitaris humeralis. Latr. In nidis apiarium. *Raro*.
Zonitis præusta. Fab. In floribus.
— *mutica*. Fab. id.
— *quadripunctata*. Fab. id.
— *bimaculata*. Latr. id. *Raro*.

FAMILIA 27. CISTELENIE.

Cistela sulphurea. Fab. In floribus.
— *elongata*. Dahl. id.
— *rufipes*. Fab. id.
— *ceramboides*. Fab. In sylvis. *Raro*.
— *testacea*. Fab. In floribus.
— *murina*. Fab. id.
Allecula morio. Fab. id.
Oedemera coerulea. Latr. In plantis.
— *anea*. Oliv. In floribus.
— *coerulescens*. Latr. id. *Raro*.
— *melanura*. Oliv. id.
— *podagrariæ*. Oliv. id.
— *ruficollis*. Oliv. id. *Raro*.
— *ustulata*. Oliv. id. *Raro*.
— *simplex*. Oliv. id.

SECTIO TERTIA. TETRAMERA.

TRIBUS PRIMA. RHYNCHOPHORI.

FAMILIA 28. BRUCHELE.

Anthribus albinus. Fab. In sylvis euganeis.
— *latirostris*. Fab. id.
— *niveirostris*. Fab. id.
Bruchus Pisi Fab. In piso et faba.
— *atomarius*. Meg. In floribus.
— *varius*. Oliv. id.
— *viciæ*. Oliv. In vicia.
— *villosus*. Fab. In floribus.
— *granarius*. Fab. In seminibus plantarum.

Bruchus seminarius. Fab. In floribus.
 — *cisti*. Fab. In floribus *cisti helianthemii*.

FAMILIA 29. CURCULIONITES.

Attelabus coryli. Fab. In corylo.
 — *avellanæ*. Fab. id.
 — *curculionides*. Fab. id.
 — *flavipes*. Fab. In plantis.
 — *ater*. Illig. id.
Rhynchites Bacchus. Latr. *Torcolo*. In vite.
 — *alliaræ*. Latr. In erysimo *alliaræ*.
 — *betulæ*. Latr. In betula.
 — *cupreus*. Latr. In hortis.
 — *populi*. Latr. In populo.
 — *æquatus*. Latr. In salice.
 — *betuleti*. Latr. In betula.
Apion frumentarium. Latr. In frumento.
 — *malvæ*. Latr. In malva.
 — *chloris*. Graven. id.
 — *craccæ*. Latr. In hortis.
 — *flavipes*. Herbst. id.
Ramphus flavicorne. Clairv. In pruno spinosa.
Brachycerus muricatus. Fab. In plantis. *Raro*.
 — *barbarus*. Fab. id. *Raro*.
 — *undatus*. Fab. id.
Brachyrhinus viridis. Latr. id.
 — *ligustici*. Latr. In campis.
 — *oblongus*. Latr. id.
Lixus latirostris. Latr. In cardui capitibus.
 — *bardanæ*. Fab. In plantis.
 — *sulcirostris*. Latr. id.
 — *ascanii*. Fab. id.
 — *paraplecticus*. Fab. In phellandrio aquatico.
 — *alternans*. Oliv. In plantis. *Raro*.
 — *anguinus*. Fab. id.
 — *pulverulentus*. Fab. id.
 — *angustatus*. Fab. id.
 — *nebulosus*. Fab. In salice.
Cionus scrophulariæ. Latr. In scrophularia.
 — *thapsus*. Latr. id.
 — *verbasci*. Latr. In verbasco.
 — *blattariæ*. Latr. id.
 — *campanulæ*. Latr. id.
Rhynchaenus alni. Fab. In alno.
 — *artemisiæ*. Panz. In artemisia.
 — *calcar*. Dej. In plantis.
 — *æthiops*. Fab. id.
 — *loniceræ*. Latr. In loniceræ.
 — *echii*. Fab. In echio.
 — *salicis*. Fab. In salice.
 — *violaceus*. Fab. In pinis eugan. *Raro*.
 — *viminalis*. Fab. In salice.

Rhynchaenus colon. Fab. In salice.
 — *ophthalmicus*. Rossi. id.
Liparus senex. Oliv. In plantis.
 — *bimaculatus*. Oliv. id.
Calandra abbreviata. Fab. id.
 — *granaria*. Fab. In granariis.
 — *orizæ*. Fab. id. *Raro*.
Cossonus linearis. Fab. In plantis.
Hylurgus ligniperda. Latr. In pinorum cortice eugan.
 — *piniperda*. Latr. id.
Tomicus typographus. Latr. In arborum cortice.
 — *monographus*. Latr. id.
Scolytus destructor. Oliv. id.
 — *pygmæus*. Oliv. id.
Hylesinus fraxini. Fab. In fraxini cortice.
 — *varius*. Fab. In lignis.
 — *fagi*. Fab. In cortice fagi.

FAMILIA 30. PAUSSILI. Nullus.

FAMILIA 31. XILOPHAGI.

Bostrichus hispidus. Oliv. In ligno carioloso. *Raro*.
 — *capucinus*. Latr. id.
 — *6-dentatus*. Latr. id.
Psoa viennensis. Fab. In sylvis. *Raro*.
Mycetophagus 4-maculatus. Fab. In fungis.
Cis boleti. Latr. In boleto versicolore.
 — *fronticornis*. Schöab. *Tarlo*. In domibus.
 — *pallida*. Schöab. id.
Nemosoma elongatum. Latr. id. *Raro*.
Ditoma crenata. Herbst. In arboribus emortuis.
Lycus oblongus. Latr. In ligno.
Latridius minutus. Latr. In domibus. *Raro*.
 — *foveolatus*. Latr. id.
Silvanus unidentatus. Latr. Sub cortice arborum. *Raro*.
 — *bidentatus*. Latr. id. *Raro*.
Colydium elongatum. Fab. id.
Trogosita caraboides. Fab. In ligno vetusto.

FAMILIA 32. CUCUJIPES.

Uleviota flavipes. Latr. In arboribus emortuis.

FAMILIA 33. PRIONI.

Spondylis buprestoides. Fab. Ad pini radices. *Raro*.
Prionus coriarius. Fab. In lignis putridis. *Raro*.
 — *scabricornis*. Fab. id. *Raro*.

FAMILIA 34. CERAMBYCINI.

Lamia ædilis. Fab. In truncis arborum. *Raro*.
 — *asphodelii*. Latr. In asphodelo.
 — *textor*. Fab. In truncis arborum.
 — *nebulosa*. Fab. id.
 — *lugubris*. Fab. id.

Lamia tristis. Fab. In truncis arborum.
 — *funesta*. Fab. id.
 — *pedestris*. Fab. id.
 — *curculionoides*. Fab. id. *Raro*.
Cerambyx moscatus. Fab. In salice.
 — *miles*. Bonel. In truncis. *Raro*.
 — *alpinus*. Fab. Id. In euganeis. *Raro*.
 — *heros*. Fab. In sylvis.
 — *cerdo*. Fab. id. et in domibus.
Purpuricenus. Koeleri. Fab. id. id.
Callidium bajulus. Fab. In domibus.
 — *russicum*. Fab. In sylvis.
 — *violaceum*. Fab. id.
 — *4. punctatum*. Fab. id.
 — *clavipes*. Fab. In sylvis, et domibus.
 — *arietis*. Fab. In floribus.
 — *femoratum*. Fab. id.
 — *arcuatum*. Fab. id.
 — *sanguineum*. Fab. In hortis. *Raro*.
 — *præustum*. Fab. id.
 — *alni*. Fab. In floribus.
 — *pygmæum*. Fab. id.
 — *fennicum*. Fab. id.
 — *undatum*. Fab. id.
 — *plebejum*. Fab. id.
 — *vini*. Panz. In cellis vinariis.
 — *testaceum*. Fab. In floribus.
Saperda carcarias. Fab. In sylvis.
 — *virescens*. Fab. id. *Raro*.
 — *scalaris*. Fab. In populo.
 — *erythrocephala*. Fab. id.
 — *tremulæ*. Fab. id.
 — *lineola*. Fab. id.
 — *punctata*. Fab. In sylvis.
 — *plumbea*. Will. id.
 — *linearis*. Fab. In corylo.
 — *populnea*. Fab. In populo.
 — *cardui*. Fab. In carduo.
 — *violacea*. Fab. In sylvis.
 — *cylindrica*. Fab. In pyro et pruno.
 — *testacea*. Fab. In sylvis.
 — *oculata*. Fab. id.
Necydalis dimidiata. Latr. In floribus.
 — *umbellatarum*. Latr. id.
 — *rufa*. Fab. id.
Leptura atra. Fab. id.
 — *4. maculata*. Fab. id.
 — *attenuata*. Fab. id.
 — *notata*. Will. id.
 — *hastata*. Fab. id.
 — *tomentosa*. Fab. id.
 — *livida*. Fab. id.

Leptura calcarata. Fab. In floribus.
 — *melanura*. Fab. id.
 — *villica*. Fab. id.
 — *præusta*. Fab. id.
 — *ruficornis*. Fab. id.
 — *testacea*. Fab. id.
 — *cincta*. Fab. id.
 — *quadrifasciata*. Fab. id.
 — *clathrata*. Fab. id.
 — *subspinosa*. Fab. id.
 — *collaris*. Will. id.
 — *sanguinolenta*. Fab. id.
Rhagium inquisitor. Fab. id. in euganeis.
 — *salicis*. Fab. In salice. id.
 — *bifasciatum*. Fab. In floribus. id.

FAMILIA 35. CHRYSOMELINÆ.

Donacia sagittariæ. Fab. In plantis aquaticis.
 — *crassipes*. Fab. In nymphæis.
 — *dentipes*. Fab. ad margines fossarum.
 — *discolor*. Hopp. id.
 — *lemnæ*. Fab. id.
 — *mengantidis*. Fab. id.
 — *vittata*. Panz. id.
 — *bidens*. Panz. id.
 — *simplex*. Fab. id.
 — *clavipes*. Oliv. id.
 — *festuæ*. Fab. In festuca aquatica.
Crioceris merdigera. Latr. In convallaria.
 — *brunnea*. Fab. In plantis.
 — *duodecimpunctata*. Fab. In asparago.
 — *asparagi*. Gyll. id.
 — *campestris*. Fab. In plantis.
 — *testacea*. Fab. id.
 — *melanopa*. Fab. id.
Hispa atra. Linn. In pratis.
 — *testacea*. Fab. id.
Cassida murræa. Fab. In plantis herbaceis.
 — *viridis*. Fab. In carduis.
 — *sanguinolenta*. Fab. In herbaceis.
 — *vibex*. Fab. id.
 — *ferruginea*. Fab. id.
 — *nobilis*. Fab. In carduis.
 — *margaritacea*. Fab. In plantis herbaceis.
 — *equestris*. Fab. In mentha aquatica.
 — *nebulosa*. Fab. In carduis.
Clythra quadripunctata. Fab. In corylo.
 — *bipunctata*. Fab. id.
 — *cyanea*. Fab. In floribus.
 — *quadrimaculata*. Fab. id.
 — *longipes*. Fab. In corylo.

- Clythra Scopolina. Fab. In floribus.
 Cryptocephalus sericeus. Fab. id.
 — coryli. Fab. In corylo.
 — flavilabris. Fab. In floribus.
 — flavifrons. Fab. id.
 — flavipes. Fab. id.
 — frontalis. Dahl. id.
 — hyeroglyphicus. Fab. id.
 — histrio. Fab. In pratis.
 — labiatus. Fab. id.
 — lineola. Fab. id.
 — imperialis. Fab. id.
 — marginatus. Fab. id.
 — bucephalus. Fab. id. *Raro*.
 — minutus. Fab. id.
 — frenatus. Fab. id.
 — moræi. Fab. In plantis.
 — biguttatus. Fab. id.
 — 8. guttatus. Fab. In floribus.
 — pygmæus. Fab. id.
 — quadrum. Zigl. In pratis.
 — auratus. Meg. In plantis.
 — violaceus. Fab. In floribus.
 — vittatus. Fab. id.
 — biniaculatus. Dej. id.
 Eumolpus vitis. Fab. In vite vinifera.
 — hirtus. Fab. In floribus. *Raro*.
 Chrysomela ænea. Fab. In mentha sylvestri.
 — elegans. Gené. id. *Raro*.
 — fastuosa. Fab. id.
 — gloriosa. Fab. id.
 — graminis. Fab. id.
 — grossa. Fab. In populo.
 — hottentotta. Fab. In pratis.
 — lamina. Fab. In mentha sylvestri.
 — limbata. Fab. In plantis.
 — lurida. Fab. id.
 — aucta. Fab. id.
 — marginata. Fab. id.
 — hæmoptera. Fab. id.
 — populi. Fab. In populo.
 — sanguinolenta. Fab. id.
 — staphyleæ. Fab. In staphylea.
 — tremulæ. Fab. In populo.
 — varians. Fab. id.
 — rufipes. Scop. In plantis. *Raro*.
 — 20. punctata. Fab. In populo.
 — septem punctata. Fab. id.
 — viminalis. Fab. In salice.
 — adonidis. Fab. In polygono.
 — armoraciæ. Fab. id.
 — polygoni. Fab. id.
 Chrysomela metallica. Fab. In plantis.
 — rugosa. Fab. In pratis. Primò Verè.
 — tenebricosa. Fab. id.
 — æthiops. Fab. id. *Raro*.
 — 10. punctata. Fab. In salice.
 Prasocuris phellandrii. Latr. In phellandrio aquatico.
 Galleruca tanaceti. Fab. In tanaceto.
 — calvariensis. Fab. In salice.
 — rustica. Fab. In campis.
 — alni. Fab. In betula alno.
 — lineola. Fab. id.
 — capræ. Fab. In salice capræ.
 — vitellinæ. Fab. In salicibus.
 — litoralis. Fab. Ad litora in plantis.
 Altica holeracea. Latr. *Pulesi de terra*. In hortis.
 — nigripes. Latr. In plantarum cotyledonibus.
 — euphorbiæ. Latr. In euphorbia.
 — aridella. Latr. id.
 — erucæ. Latr. In hortis.
 — ventralis. Latr. In hortis.
 — violacea. Latr. id.
 — fuscicornis. Latr. id.
 — testacea. Latr. In plantis.
 — nitidula. Latr. id.
 — helxines. Latr. id.
 — flexuosa. Latr. id.
 — nemorum. Latr. id.
 — armoraciæ. Duft. In cochlearia.
 — dentipes. Schön. In hortis.
 — fuscipes. Peir. In plantis.
 — malvæ. Str. In malva.
 — jaceæ. Latr. id.
 — tabida. Oliv. In plantis. *Raro*.
 FAMILIA 36. EROTYLENÆ.
 Agathidium minutum. Stm. In plantis. *Raro*.
 Tritoma 2-pustulatum. Fab. In boletis.
 — nigripenne. Latr. In plantis. *Raro*.
 SECTIO QUARTA. TRIMERI.
 FAMILIA 37. COCCINELLIDÆ.
 Endomychus coccineus. Fab. Sub arborum cortice.
 Lycoperdina immaculata. Latr. In lycoperdo bovista.
 — 4-pustulata. Latr. In lycoperdis.
 Coccinella impunctata. Oliv. *Ave Maria*. In hortis.
 — bipunctata. Fab. In plantis.
 — 5-punctata. Fab. id.
 — 6-punctata. Linn. id.
 — 7-punctata. Fab. id.
 — 8-punctata. Fab. In hortis.
 — 9-punctata. Schön. id.
 — 10-punctata. Fab. id.

Coccinella 11-punctata. Schön. In hortis.

- 13-punctata. Fab. id.
- 14-punctata. Linn. In plantis.
- 16-punctata. Fab. id.
- 18-punctata. Fab. id.
- 20-punctata. Scop. id.
- 22-punctata. Illig. id.
- 24-punctata. Linn. id.
- bipustulata. Fab. In hortis.
- 4-pustulata. Fab. In plantis.
- 6-pustulata. Linn. In hortis.
- 10-pustulata. Fab. id.
- 14-pustulata. Linn. id.
- oblongo guttata. Fab. id.
- biguttata. Linn. In plantis.
- bis sex guttata. Panz. id.
- bis 7-guttata. Fab. id.
- 10-guttata. Fab. In hortis.
- 14-guttata. Fab. id.
- conglobata. Illig. In plantis.
- dispar. Fab. id.
- unifasciata. Linn. id.
- globosa. Linn. id.
- tessulata. Scop. id. *Raro*.
- variabilis. Linn. In hortis.
- conglomerata. Fab. id.
- mutabilis. Illig. In plantis.

Scymnus bis pustulatus. Fab. In cortice arborum.

- biverrucatus. Herbst. id.
- bis-biverrucatus. Panz. id.
- flavipes. Fab. id.
- humeralis. Fab. id.

SECTIO QUINTA. DIMERI.

FAMILIA 38. PSELAPHI.

Pselaphus sanguineus. Fab. In sabuletis.

- impressus. Panz. id.
- Heisei. Herbst. In floribus.

ORDO SECUNDUS. ORTOPTERA.

SECTIO PRIMA.

Forficula gigantea. Fab. *Forfasetta*. In ligno antiquo.

- auricularia. Fab. In plantis.
- 2-punctata. Fab. id.
- minor. Fab. id.

SECTIO SECUNDA.

Blatta orientalis. Linn. *Schiavo*. In culinis.

- americana. Linn. In domibus. *Raro*.
- marginata. Fab. In plantis. *Raro*.
- sylvestris. Scop. id.

SECTIO TERTIA.

FAMILIA 1. MANTIDES.

- Phasma rossia*. Fab. In pratis siccis. *Rarissimo*.
- Mantis religiosa*. Linn. id.
- oratoria. Linn. id.
- Mantispa pagana*. Illig. id. *Rarissimo*.

FAMILIA 2. GRYLLIDES.

- Gryllo talpa vulgaris*. Latr. *Zeccarola*. In hortis.
- Xya tridactylites*. Ill. In sabulosis humidis.
- Gryllus campestris*. Latr. *Grillo*. In pratis.
- domesticus. Latr. id. In domibus.
- pellucidus. Latr. *Ostanello*. In hortis.
- griseo-apterus. De Geer. In domibus.

FAMILIA 3. LOCUSTARIÆ.

- Locusta viridissima*. Fab. *Cavalletta*. In plantis.
- verrucivora. Fab. In pratis.
- lilifolia. Fab. In plantis.
- ephippiger. Fab. id.
- punctatissima. Latr. id.
- grisea. Fab. id.
- tuberculata. Latr. id.
- setigera. Latr. id.
- falcata. Scop. In pratis.

FAMILIA 4. ACRYDII.

- Truxalis nasutus*. Fab. In pratis.
- turritus. Linn. id.
- Acrydium migratorium*. Latr. id.
- tataricum. Latr. id.
- cærulescens. Latr. id.
- italicum. Latr. In siccis arenosis.
- stridulum. Latr. id.
- cærulans. Latr. id.
- viridulum. Latr. In pratis.
- biguttulum. Latr. id.
- grossum. Latr. id.
- pedestre. Latr. In campis.
- lineola. Latr. *Cavaletta*. In hortis.
- thalassinum. Latr. In arenosis.
- lunulatum. Latr. id.
- Tetrix subulata*. Latr. In campis.
- bipunctata. Latr. id.

ORDO TERTIUS. EMIPTERA.

SECTIO PRIMA.

FAMILIA 1. CORISIÆ.

- Scutellera nigrolineata*. Latr. In plantis.
- semipunctata. Latr. id. *Raro*.
- pedemontana. Latr. id. *Raro*.

Scutellera fuliginosa, Latr. In plantis. *Raro.*
 — tuberculata, Latr. id. *Raro.*
 — scarabæoides, Latr. id. *Raro.*
 — grammica, Latr. id. *Raro.*
 — globus, Latr. id.
 — nigellæ, Fabr. id.

Pentatoma acuminata, Latr. In graminosis.

— albipes, Latr. id.
 — punctata, Latr. id.
 — grisea, Latr. *Cimese salvadego.* Hibernat in domibus. id.

— nigricornis, Latr.
 — rufipes, Latr. In hortis.
 — bidens, Latr. id.
 — hæmorrhoidalis, Latr. id.
 — marginata, Latr. In plantis.
 — umbrina, Latr. id.
 — torquata, Latr. id.
 — prasina, Latr. In hortis.
 — juniperina, Latr. In junipero.
 — tristriata, Latr. In plantis.
 — liturata, Latr. id.
 — interstincta, Latr. id.
 — baccarum, Latr. In hortis.
 — perlata, Latr. id.
 — sphacelata, Latr. id.
 — Linx, Latr. In plantis. *Raro.*
 — dissimilis, Latr. id.
 — melanocephala, Latr. id.
 — agathina, Latr. id.
 — ornata, Latr. id.
 — festiva, Latr. id.
 — bipunctata, Latr. id.
 — oleracea, Latr. id.
 — biguttata, Latr. id.
 — bicolor, Latr. id.
 — albo-marginata, Latr. In plantis.
 — flavicornis, Latr. id.

Cydnus morio, Fabr. In campis, et hortis.
 — tristis, Fab. id. id.

Coreus marginatus Fab. In plantis.

— capitatus, Fab. id.
 — spiniger, Fab. id.
 — hirticornis, Fab. id.
 — venator, Fab. id.
 — purgator, Fab. id. *Raro.*
 — crassicornis, Fab. id.
 — quadratus, Fab. id. *Raro.*
 — scapha, Fab. id.
 — nugax, Fab. id.

Neides tipularia, Latr. In pratis. *Raro.*

Lygæus equestris, Fab. In hortis.

Ligæus saxatilis, Fab. In hortis.

— hyoseyami, Latr. In hyoseyamo.
 — familiaris, Latr. In hortis.
 — militaris, Latr. id.
 — bipunctatus, Latr. id.
 — punctum, Latr. id.
 — coryli, Latr. In corylo.
 — punctato-guttatus, Latr. In plantis.
 — roseus, Fab. In pratis. *Raro.*
 — melanocephalus, Latr. In plantis.
 — aterrimus, Latr. id.

— apterus, Latr. In hortis.
 — sylvaticus, Latr. id.
 — chiragra, Latr. In plantis. *Raro.*
 — pallicornis, Latr. id.

Alydus calcaratus, Fab. In muscis.

Capsus elatus, Latr. In plantis. *Raro.*

— neglectus, Latr. id.
 — gramineus, Latr. id.
 — flavicollis, Latr. id.
 — trifasciatus, Latr. id.
 — spissicornis, Latr. id.
 — agilis, Latr. id.
 — sphegiformis, Latr. id. *Raro.*
 — scriptus, Latr. id.
 — hyalinatus, Latr. id. *Raro.*
 — ater, Fab. In hortis.

— bipunctatus, Fab. id.

— tyrannus, Fab. id.

— seticornis, Fab. In plantis.

— Scach, Fab. id. *Raro.*

— gothicus, Fab. id.

Miris campestris, Latr. In graminosis.

— pratensis, Latr. In pratis.

— lævigatus, Latr. id.

— pabulinus, Latr. id.

— marginellus, Latr. In plantis.

— vagans, Latr. id.

— ulmi, Latr. In ulmo.

— virens, Latr. In pratis.

— dolabratus, Fab. In plantis.

— ferus, Latr. In sylvis.

— striatus, Fab. In ulmo.

— gramineus, Latr. In gramine.

FAMILIA 2. CIMICIDES.

Reduvius personatus, Latr. In domibus.

— stridulus, Latr. id.

— annulatus, Latr. In corylo.

— iracundus, Latr. In plantis.

— apterus, Latr. In domibus.

— albipes, Latr. In plantis.

Reduvius cruentatus. Latr. In plantis.
Ploiera vagabunda. Latr. id.
 — *domestica*. Latr. In domibus.
Hydrometra stagnorum. Fab. In fossis stagnantibus.
Velia currens. Latr. id.
Gerris sacustris. Latr. id.
 — *paludum*. Latr. id.
Cimex lectularius. Latr. *Cimex*. In domibus.
Tingis pyri. Fab. In foliis pyri.
 — *clavicornis*. Fab. In hortis. *Raro*.
 — *cardui*. Fab. In cardo sylvestri.
Aradus corticalis. Fab. In arboribus.
 — *betulæ*. Fab. In betula alba.
Acanthia zosteræ. Latr. In inundatis salsis.
 — *litoralis*. Latr. id.
 — *sylvestris*. Fab. In sylvis. *Raro*.

FAMILIA 3. HYDROCORISÆ.

Naucoris cimicoides. Fab. In aquis fossarum.
Nepa cinerea. Linn. id.
Ranatra linearis. Fab. id.
Notonecta glauca. Fab. id.
 — *maculata*. Fab. id.
 — *minutissima*. Fab. id.
Corixa striata. Latr. id.
 — *minuta*. Latr. id.

SECTIO SECUNDA.

FAMILIA 4. CICADARIE.

Cicada plebeja. Latr. *Cigala*. In truncis arborum.
 — *hæmatodes*. Latr. In plantis.
 — *orni*. Latr. In truncis arborum.
 — *tibialis*. Latr. In pratis.
Cercopis spumaria. Fab. Inter spumam trifolii.
 — *sanguinolenta*. Fab. In salicibus.
 — *bifasciata*. Fab. In plantis.
 — *leucophthalma*. Fab. id. *Raro*.
 — *leucocephala*. Fab. id. *Raro*.
 — *grisea*. Fab. id.
 — *lateralis*. Fab. In pratis.
 — *atomaria*. Fab. id.
 — *unifasciata*. Fab. In plantis.
 — *rustica*. Fab. id.
 — *ruficollis*. Fab. id.
 — *striatella*. Fab. id.
 — *populi*. Fab. In populo.
 — *angulata*. Illig. In hortis. *Raro*.
 — *reticulata*. Fab. id.
 — *vulnerata*. Illig. id. *Raro*.
 — *lineata*. Fab. id.
Ledra aurita. Fab. In quercu.
Membracis cornuta. Latr. In salicibus.

Membracis genistæ. Fab. In genista.
Tettigonia flavicollis. Latr. In plantis.
 — *vittata*. Latr. In pratis.
 — *prasina*. Latr. In plantis.
 — *interrupta*. Latr. id.
 — *viridis*. Latr. In pratis.
 — *punctata*. Latr. id.
 — *aurata*. Latr. id.
Tetigometra virescens. Latr. In plantis. *Raro*.
Fulgora europæa. Latr. In corylo, et pratis.
Flata nervosa. Fab. In plantis.
Jassus lanio. Fab. id. *Raro*.
 — *4-verrucatus*. Fab. id. *Raro*.
 — *fulgidus*. Fab. id.
 — *rosæ*. Fab. In rosæ foliis.
 — *maculatus*. Fab. id. *Raro*.
Issus grylloides. Fab. In plantis. *Raro*.
 — *apterus*. Fab. id. *Raro*.
 — *coleopratus*. Fab. id.
 — *immaculatus*. Fab. id. *Raro*.
Cixius leporinus. Latr. id. *Raro*.
Asiraca crassicornis. Latr. id. *Rarissimo*.

FAMILIA 5. PSYLLIDÆ.

Psylla alni. Latr. In alni ramulis.
 — *ficus*. Latr. In foliis fici.
 — *buxi*. Latr. In foliis buxi.
 — *fraxini*. Latr. In fraxino.
 — *pyri*. Latr. In foliis pyri.
 — *genistæ*. Latr. In foliis genistæ.
 — *abietis*. Latr. In strobis abietis.
Livia juncorum. Latr. In juncis.
Thrips physapus. Latr. In floribus compositis.
 — *juniperina*. Fab. In juniperi gallis.
 — *ulmi*. Fab. In corticibus ulmi.
 — *urticæ*. Fab. In foliis urticæ.
 — *fasciata*. Fab. In floribus compositis.
 — *minutissima*. Fab. In floribus.
Aphis quercus. Latr. *Peochj delle piante*. In quercus,
 et in robore. id.
 — *roboris*. Latr. id.
 — *ulmi*. Latr. In ulmo campestri.
 — *populi*. Latr. In foliis populi tremulæ.
 — *sambuci*. Latr. In ramis sambuci nigræ.
 — *fagi*. Latr. In fago sylvatica.
 — *sonchi*. Latr. In soncho oleraceo.
 — *nivea*. Latr. In fico.
 — *ribis*. Fab. In foliis monstrosis ribis.
 — *arundinis*. Fab. In foliis arundinis epigejos.
 — *pastinacæ*. Fab. In pastinaca sativa.
 — *pruni*. Fab. In foliis pruni.
 — *cerasi*. Fab. In cerasi foliis.

- Aphis rosæ. Fab. In rosæ pedunculis.
 — brassicæ. Fab. In foliis brassicæ oleraceæ.
 — lactucæ. Fab. In lactuca oleracea.
 — cardui. Fab. In caulibus cardui acanthoidis.
 — fraxini. Fab. In fraxini excelsioris ramis.
 — alni. Fab. In betulæ alni foliis.
 — salicis. Fab. In salicibus.
 — vitis. Fab. In vite vinifera.
 — urticæ. Fab. In urticæ dioicæ foliis.
 — juglandis. Latr. In foliis nucis juglandis.
 — gallarum. Latr. In gallis ulmorum.
 — capreæ. Fab. In salice caprea.
 — solidaginis. Fab. In caulibus solidaginis virgaureæ.
 — bursaria. Fab. In sacculis foliorum populi.
 — aceris. Fab. In foliis aceris campestris.
 — rumicis. Fab. In rumice lapatho.
 — achilleæ. Fab. In achillea millefolia.
 — corni. Fab. In foliis corni sanguineæ.
 — absinthii. Fab. In artemisia absinthio.
 — evonymi. Fab. In foliis evonymi europæi.
 — avenæ. Fab. In avena sativa.
 — betulæ. Fab. In betulæ albæ foliis.
 — viburni. Fab. In foliis viburni opuli.
 — mali. Fab. In foliis pyri mali.
 — atriplicis. Fab. In atriplice hortensi.
 — picridis. Fab. In picridis hieracioidis foliis.
 — ægopodii. Fab. In ægopodii podagrariæ foliis.
 — dauci. Fab. In dauci carotæ umbella.
 — tanacetii. Fab. In tanacetii vulgaris caulibus.
 — tilia. Fab. In tilia europæa.
 — juniperi. Fab. In juniperi communis foliis.
 — acetosæ. Fab. In rumice acetosa.
 — viciæ. Fab. In foliis viciæ craccæ.

FAMILIA 7. GALLINSECTA.

- Dorthesia characias. Latr. In euphorbia characias.
 Coccus hesperidum. Latr. In citro, aurantio etc.
 — caricæ. Fab. In ficu carica.
 — oleæ. Latr. In oleæ foliis.
 — phalaridis. Latr. Ad graminum radices.
 — vitis. Fab. In ramis vitis vinifera.
 — fragariæ. Latr. In fragaria vesca.
 — adonidum. Latr. In arboribus.
 — coryli. Fab. In corylo avellana.
 — rusci. Fab. In rusco aculeato.
 — cratægi. Fab. In crataego oxyacantha.
 — persicæ. Fab. In amygdalo persica.
 — farinosus. Latr. In gallis ulmorum.
 — ulmi. Latr. In ulmi cortice.

ORDO QUARTUS. NEUROPTERA.

TRIBUS PRIMA. SUBULICORNES.

SECTIO PRIMA.

FAMILIA 1. LIBELLULINÆ.

- Libellula 4-maculata. Linn. *Corugoli, Cava occhj.*
 In aquis fossarum.
 — depressa. Fab. id.
 — vulgatissima. Latr. id.
 — vulgata. Latr. id.
 — flaveola. Latr. id.
 — ænea. Latr. id.
 — rubicunda. Fab. id.
 Aeshna forcipata. Fab. *Corugolo.* id.
 — grandis. Fab. id.
 Agrion virgo. Fab. id.
 — puella. Fab. id.

SECTIO SECUNDA.

- Ephemera vulgata. Fab. In aquis.
 — lutea. Fab. id.
 — vespertina. Fab. id.
 — culiciformis. Fab. id.
 — nigra. Fab. id. *Raro.*
 — fuscata. Fab. id. *Raro.*
 — horaria. Fab. id.
 — striata. Fab. id.

TRIBUS SECUNDA. FILICORNES.

SECTIO PRIMA.

DIVISIO PRIMA.

FAMILIA 2. PANORPATÆ.

- Panorpa communis. Fab. In sæpibus.
 Bittacus tipularius. Latr. id. *Rarissimo.*

FAMILIA 3. MYRMELEONIDES.

- Myrmeleon formicarium. Fab. In sabulosis.
 Ascalaphus barbarus. Fab. In pratis. *Raro.*
 — italicus. Fab. id. *Raro.*

FAMILIA 4. HEMEROBINI.

- Hemerobius perla. Fab. In arboribus.
 — chrysops. Fab. In domibus.
 — phalænoides. Fab. In plantis. *Raro.*
 Sialis niger. Latr. In locis aquaticis. *Raro.*

DIVISIO SECUNDA.

- Raphidia ophiopsis. Fab. In arboribus. *Raro.*
 Psocus pulsatorius. Fab. In lignis vetustis.
 — bipunctatus. Fab. In hortis. *Raro.*
 — fatidicus. Fab. In quisquiliis. *Raro.*

DIVISIO QUARTA.

FAMILIA 5. PERLARIÆ.

- Perla bicaudata, Latr. In aquosis. *Raro.*
 — lutaria, Fab. id. *Raro.*
 — nebulosa, Fab. id. *Raro.*

SECTIO SECUNDA.

- Phryganea reticulata, Fab. In aquosis.
 — striata, Fab. id. *Raro.*
 — grandis, Fab. id.
 — rhombica, Fab. id. *Raro.*
 — bimaculata, Fab. id.
 — nigra, Fab. id.
 — bilineata, Fab. id. *Raro.*
 — flava, Latr. id. *Raro.*
 — grisea, Latr. id.
 — longicornis, Fab. id. *Raro.*
 — minuta, Fab. id.
 — fusca, Fab. id.
 — pallipes, Fab. id. *Raro.*
 — martia, Scop. id.

ORDO QUINTUS. HYMENOPTERA.

TRIBUS PRIMA. TEREBRANTIA.

SECTIO PRIMA. PHYTIPHAGA.

FAMILIA 1. TENTHREDINETÆ.

- Cimbex femorata, Fab. M. In salice primo vere.
 — lutea, Fab. Fgm. id.
 — amerinæ, Fab. id.
 — sericea, Fab. In betula.
 — vitellinæ, Fab. In salice.
 — fasciata, Fab. id. *Raro.*
 — marginata, Fab. id. *Raro.*
 — læta, Fab. id.
 — lucorum, Fab. In betula albo.
 Tenthredo similis, Latr. In salice.
 — scrophulariæ, Fab. In scrophularia.
 — viridis, Fab. In alni foliis.
 — rustica, Fab. In lonicera caprifolio.
 — germanica, Fab. In sylvis.
 — flavicornis, Fab. id. *Raro.*
 — blanda, Fab. id. *Raro.*
 — rufiventris, Fab. id.
 — atra, Fab. id.
 — crassa, Latr. id. *Raro.*
 — nigra, Fab. In brassica rapa. *Raro.*
 — opaca, Fab. id. *Raro.*
 — livida, Fab. In nemoribus.
 — fera, Fab. id.
 — abdominalis, Latr. id. *Raro.*

- Tenthredo ovata, Latr. In albo.
 — capreæ, Fab. In salice.
 — cingulata, Latr. id. *Raro.*
 — ferruginea, Latr. id.
 — tibialis, Latr. id.
 — rapæ, Fab. In rapæ foliis.
 — ribis, Fab. In ribis foliis.
 — tristis, Fab. In plantis.
 — morio, Fab. id.
 — stigma, Fab. id.
 — costalis, Latr. id.
 — interrupta, Fab. In salice.
 — punctata, Fab. In plantis. *Raro.*
 — spinarum, Fab. In rubo fruticoso.
 — parva, Fab. In plantis. *Raro.*
 — cincta, Fab. In nemoribus.
 — bicincta, Fab. id.
 — alni, Fab. In alni foliis.
 — cerasi, Fab. In cerasi foliis.
 — læta, Fab. In plantis.
 Nematus salicis, Spinol. In salice.
 — septemtrionalis, Spin. In plantis.
 — miosotydis, Spin. id. *Raro.*
 Hylotoma pagana, Latr. In salice.
 — cærulescens, Fab. id.
 — enodis, Fab. id.
 — rosæ, Fab. In rosa, et hortis.
 — ustulata, Fab. In rosa canina.
 — ephippium, Fab. id. *Raro.*
 — eglanteriæ, Fab. In rubo fruticoso.
 Lophyrus pini, Latr. In euganeis. *Raro.*
 — juniperi, Latr. id.
 — difformis, Latr. id.
 — dorsatus, Latr. id. *Raro.*
 Megalodontes cephalotes, Latr. id. *Raro.*
 Pamphilus populi, Latr. In populo. *Raro.*
 — saltuum, Latr. id.
 Cephus pygmæus, Fab. In floribus.
 — tabidus, Fab. id. *Raro.*

FAMILIA 2. UROCERATA.

- Urocerus Gigas, Latr. In arboribus. Larva.
 — iuvencus, Latr. In ligno putrescente. *Raro.*
 — mariscus, Latr. id.

SECTIO SECUNDA. PUPOPHAGA.

FAMILIA 3. EVANIALES.

- Evania appendigaster, Latr. In plantis.
 — minuta, Latr. id. *Raro.*
 Fænus jaculator, Fab. In larvis sphegum.
 — assectator, Fab. id. In hortis.

FAMILIA 4. ICHNEUMONIDES.

Ichneumon pisorius. Latr.	In larvis.	
— ovator. Latr.	id.	
— pendulator. Latr.	id.	
— extensor. Latr.	id.	
— emigrator. Latr.	id.	
— pedicularis. Latr.	id.	
— lætatorius. Latr.	id.	
— comitator. Latr.	id.	
— molitorius. Latr.	In hortis.	
— viator. Latr.	In larvis.	
— lutatorius. Latr.	id.	
— vaginatorius. Latr.	id.	
— extensorius. Latr.	id.	
— deliratorius. Latr.	id.	
— saturatorius. Latr.	id.	
— raptorius. Latr.	id.	
— delusor. Latr.	In nemoribus.	
— titillator. Latr.	In larvis.	
— ferrugineus. Latr.	id.	
Pimpla manifestator. Fab.	In sabulosis.	
— flavicans. Fab.	id.	Raro.
— persuasoria. Fab.	id.	
— arundinator. Fab.	In arundinestis.	
Cryptus castigator. Fab.	In larvis.	
— instigator. Fab.	id.	
— variatorius. Fab.	id.	
Bracon denigrator. Latr.	In hortis.	
— flavator. Latr.	In plantis.	Raro.
— desertor. Latr.	In larvis.	
— nominator. Latr.	id.	
Microgaster globatus. Latr.	id.	
— deprimator. Latr.	id.	
Ophion luteus. Fab.	id.	
— nidulator. Fab.	id.	
— jocator. Fab.	id.	
— enecator. Fab.	id.	
— ramidulus. Fab.	id.	
Banchus pictus. Fab.	id.	
— venator. Fab.	id.	Raro.
Sigalphus rufescens. Latr.	id.	Raro.
— oculator. Latr.	id.	Raro.
— sulcatus. Latr.	id.	Raro.
Bassus seductorius. Spin.	id.	

FAMILIA 5. DIPLOLEPARIÆ.

Diplolepis quercus folii. Latr.	In gallis.	
— quercus radiciis. Latr.	id.	
— quercus inferus. Latr.	id.	
— rosæ. Latr.	id.	
— glechomæ. Latr.	id.	

Diplolepis quercus pedunculi. Latr.	In gallis.	
— viminalis. Latr.	id.	
— puparum. Fabr.	In pupis papilionum.	

FAMILIA 6. CYNIPSERA.

Leucospis dorsigera. Fab.	In larvis.	
Chalcis minuta. Fab.	id.	
— podagrica. Fab.	id.	
— clavipes. Fab.	id.	
— sispes. Fab.	id.	
— ænea. Fab.	id.	Raro.
Eurytoma plumata. Latr.	id.	Rarissimo.
— verticillata. Latr.	id.	Rarissimo.
Cynips capreæ. Latr.	In gallis.	
— bedeguaris. Latr.	id.	
Eulophus ramicornis. Latr.	In larvis.	Rarissimo.
Perilampus violaceus. Latr.	In gallis.	
— italicus. Latr.	id.	
Pteromalus gallarum. Latr.	id.	

TRIBUS SECUNDA. TUBULIFERA.

FAMILIA 7. PROCTOTRUPIS.

Sparasion cornutum. Latr.	In floribus.	Raro.
Diapria cornuta. Latr.	id.	Raro.
Proctotrupes gravidator. Spin.	id.	Raro.
Bethylus glabratus. Fab.	id.	Raro.

FAMILIA 8. CHRYSIDIDES.

Cleptes semiaurata. Fab.	Ad muros, in floribus.	
Elampus auratus. Latr.	id.	id.
Hedychrum regium. Spinol.	id.	id.
Parnopes carnea. Latr.	id.	id.
Stilbum calens. Spin.	id.	id.
Chrysis ignita. Fab.	Mosca d'oro. Ad muros.	
— purpurata. Fab.	id.	
— comparata. Lepellet.	id.	
— splendidula. Rossi.	id.	
— fulgida. Fab.	id.	
— cyanea. Fab.	id.	
— bidentata. Fab.	id.	

TRIBUS TERTIA. ACULEATA.

SECTIO PRIMA. PRÆDONES.

FAMILIA 9. SPHEGIMÆ.

Ammophila arenaria. Latr.	In sabulosis.	
— anulata. Latr.	id.	
Spheg holosericea. Jur.	id.	
— flavipennis. Fab.	In floribus.	
Pelopæus spirifex. Fab.	In culinis.	
— distillatorius. Illig.	In sabulosis.	
Peplis 4-punctata. Fab.	In statice floribus.	Raro.

Ceropales variegata. Fab. In sabulosis.
 — *maculata*. Fab. id.
Pompilus fuscus. Fab. In sabuletis.
 — *rufipes*. Fab. id.
 — *pulcher*. Fab. id.
 — *ater*. Illig. id.
 — *gibbus*. Fab. id.
 — *niger*. Fab. id.
 — *viaticus*. Fab. id.
 — *plumbeus*. Spin. id. *Raro*.

FAMILIA 10. CRABRONITES.

Astata nitida. Spinol. In floribus. *Raro*.
Larra ichneumoniformis. Fab. In sabuletis.
 — *anatema*. Coqueb. id.
Lyrops tricolor. Latr. id.
Miscophus bicolor. Jurin. id.
Dinetus pictus. Jur. In floribus.
Trypoxylon figulus. Fab. id.
Oxybelus tridens. Fab. id.
 — *mucronatus*. Fab. id.
 — *zonatus*. Spin. id.
 — *uniglumis*. Fab. id.
Crabro subterraneus. Fab. In floribus.
 — *leucostoma*. Latr. id.
 — *crassipes*. Fab. id.
 — *cephalotes*. Fab. In umbellatis.
 — *lapidarius*. Fab. In muris.
 — *cribrarius*. Fab. In floribus.
 — *geniculatus*. Fab. id.
 — *analys*. Spinol. id.
 — *sub-æneus*. Spin. id. *Raro*.
 — *lituratus*. Panz. id. *Raro*.
 — *vagus*. Fab. id.
 — *serripes*. Spinol. id. *Raro*.
 — *albilabris*. Spinol. id.
Pemphredon unicolor. Latr. id.
 — *lugubre*. Latr. id.
Alyson spinosum. Jur. id.
Gorytes 5 cinctus. Latr. id.
Nysson maculatus. Latr. id. *Raro*.
Psen ater. Latr. id.
 — *rufum*. Spinol. id.
Cerceris emarginata. Spinol. id.
 — *fasciata*. Spin. id.
 — *ornata*. Spin. id.
Philanthus coronatus. Fab. id.
 — *apivorus*. Latr. id.

FAMILIA 11. BEMBECIDES.

Bembex sinuata. Panz. In sabulosis.
 — *integra*. Fab. id.

Bembex rostrata. Fab. In sabulosis.
Stizus sinuatus. Jur. id.

FAMILIA 12. SCOLIETÆ.

Scolia flavifrons. Fab. In laryis oryctis nasicornis.
 — *hortorum*. Fab. In alii cepæ floribus.
 — *bimaculata*. Fab. In floribus-eryngii maritimi.
 — *insubrica*. Rossi. id.
 — *interrupta*. Panz. id.
 — *sexmaculata*. Fab. id.
 — *bifasciata*. Rossi. id.
 — *bicincta*. Rossi. id.
 — *quadripunctata*. Fab. id.
 — *sexpunctata*. Rossi. id.
 — *variegata*. Rossi. id.
 — *quadrinaculata*. Fab. id.
Polochrum repandum. Spin. In floribus. *Rarissimo*.
Tengira sanvitali. Latr. id. *Rarissimo*.
Tiphia femorata. Fab. id.

FAMILIA 13. MUTILLARÆ.

Methoca domestica. Latr. In arenosis.
Myrmosa atra. Panz. In terra.
Mutilla coronata. Fab. In arenosis.
 — *europæa*. Fab. id.
 — *italica*. Fab. id. *Raro*.
 — *pedemontana*. Fab. id. *Raro*.

FAMILIA 14. FORMICARÆ.

Formica herculeana. Fab. *Formigon*. In truncis putrescentibus.
 — *pubescens*. Fab. id.
 — *rufa*. Fab. *Formigolon*. In acervis sabulosis.
 — *fusca*. Fab. *Formigola*. In sylvis.
 — *dorsata*. Jur. In agris. *Raro*.
 — *capitata*. Spin. id. *Raro*.
 — *quadripunctata*. Fab. In arenosis. *Raro*.
 — *barbara*. Fab. id. *Raro*.
 — *nigra*. Latr. *Formiga*. In domibus.
 — *structor*. Jur. In plantis.
 — *flava*. Fab. In sylvis.
Myrmica rubra. Latr. Sub lapidibus.
 — *cæspitum*. Latr. In pratis siccis.

FAMILIA 15. VESPARIÆ.

Eumenes petiolata. Fab. In floribus. *Raro*.
 — *coarctata*. Fab. id.
 — *pomiformis*. Fab. id.
Odynerus murarius. Latr. In muris.
 — *parietinus*. Latr. *Vespa*. id.
 — *xantici*. Spin. In floribus. *Raro*.
 — *6-cinctus*. Latr. id.

- Odynerus acutus. Spin. In floribus.
 — Guffroianus. Spin. id. *Raro*.
 — trifasciatus. Spin. id.
 — emarginatus. Spin. id.
 Polistes gallica. Fab. *Vespa*. Sub. tectis.
 Vespa crabro. Fab. *Gavalaron*. In domibus.
 — vulgaris. Fab. *Vespa*. In terra.
 — germanica. Fab. id. id.
 — media. Latr. In arborum ramis.
 — quadrata. Latr. In terra. *Raro*.

FAMILIA 16. MASARIDES.

- Celonites apiformis. Fab. In floribus. *Raro*.

SECTIO SECUNDA. ANTOPHILA.

FAMILIA 17. ANDRENETÆ.

- Colletes succincta. Latr. In arenosis.
 Hylæus annulatus. Latr. In floribus.
 — lævigatus. Jur. id.
 — sexnotatus. Spin. id.
 — parvulus. Spin. id.
 — alternans. Spin. id.
 — rubicundus. Spin. id.
 Prosopis frontalis. Fab. id.
 — bipunctata. Fab. id.
 — albipes. Fab. id.
 Andrena pilipes. Fab. id.
 — thoracica. Fab. In sylvis.
 — alternans. Fab. In floribus. *Raro*.
 — lævigata. Spin. id.
 — subaurata. Spin. id.
 — stragulata. Spin. id.
 — marginata. Fab. id.
 — lagopus. Spin. id.
 — tricineta. Spin. id.
 — chrysosceles. Spin. id.
 — minutula. Spin. id.
 Dasypoda hirtipes. Fab. id.
 — hirta. Fab. id.
 Sphecodes gibbus. Latr. id.
 — moniliformis. Spin. id.
 — Geoffroiella. Spin. id.
 Halictus parvulus. Latr. id.
 — 6-cinctus. Latr. id.
 — saladonius. Latr. id.
 — leucozonius. Spin. id. *Raro*.
 — cylindricornis. Spin. id. *Raro*.
 — minutus. Latr. id.
 — lævigatus. Spin. id.
 — abdominalis. Spin. id.
 — subauratus. Latr. id.
 — grandis. Latr. id.

FAMILIA 18. APIARIÆ.

- Systropha spiralis. Illig. In floribus convolvuli.
 — curvicornis. Spin. id.
 Panurgus unicolor. Spin. In floribus.
 Xylocopa violacea. Fab. In floribus labiatis.
 Ceratina albilabris. Latr. In floribus.
 Heriades truncorum. Spin. id. *Raro*.
 — campanularum. Spin. id.
 — conica. Spin. id.
 — armata. Spin. id. *Raro*.
 — pusilla. Spin. id.
 — sinuata. Spin. id.
 Stelis phœoptera. Panz. id. *Raro*.
 Osmia cornuta. Latr. id.
 — fulviventris. Latr. id.
 — melanogaster. Spin. id.
 — cœrulescens. Spin. id.
 Megachile argentata. Latr. id.
 — manicata. Latr. id.
 — Willuglabiella. Latr. id.
 — muraria. Latr. Nidificat ad muros.
 Coelioxys conica. Latr. In floribus.
 Anthidium interruptum. Fab. id.
 — maculatum. Spin. id.
 — florentinum. Fab. id.
 — punctatum. Spin. id.
 — diadema. Spin. id.
 Nomada zonata. Spin. id.
 — sexfasciata. Spin. id.
 — lineola. Spin. id.
 — minuta. Fab. id.
 — solidaginis. Fab. id.
 — ruficornis. Fab. id.
 Melecta fasciculata. Spin. id. *Raro*.
 — nigra. Spin. In floribus.
 — armata. Spin. id. *Raro*.
 Crocisa histrionica. Jur. id. *Raro*.
 Eucera longicornis. Fab. id.
 — tuberculata. Latr. id. *Raro*.
 — grisea. Fab. id.
 Anthophora fasciata. Spin. id.
 — femorata. Spin. id.
 — pilipes. Latr. id.
 — acervorum. Spin. id.
 — hispanica. Latr. id.
 Lagopoda 4-fasciata. Spin. id.
 Megilla retusa. Spin. id.
 — dumetorum. Spin. id.
 Melliturga clavicornis. Latr. id.
 Saropoda rotundata. Latr. id.
 Bombus terrestris. Latr. *Avon*. Nidificat in terra.
 — italicus. Fab. In floribus labiatis.

Bombus ruderus. Latr. In floribus labiatis.

— *autumnalis*. Fab. id.

— *sylvarum*. Latr. id.

— *harrisellus*. Spin. id. *Raro*.

— *lapidarius*. Latr. id.

— *muscorum*. Latr. Nidificat in muscis.

— *hypnorum*. Fab. id.

— *atricornis*. Spin. In floribus. *Raro*.

— *campestris*. Fab. In floribus solidaginis.

— *ligusticus*. Spin. In labiatis. *Rarissimo*.

— *xanthurus*. Illig. id. *Raro*.

— *hortorum*. Fab. id.

— *equestris*. Fab. id.

— *subterraneus*. Fab. id.

Apis mellifica. Linn. *Ava*. In alvearibus culta.

ORDO SEXTUS. LEPIDOPTERA.

TRIBUS PRIMA. DIURNA.

FAMILIA 1. PAPILIONIDES.

Satyrus hyperanthus. Latr. In poa annua.

— *pamphilus*. Latr. In cynosuro cristato.

— *arcanus*. Latr. In melica.

— *fauna*. Latr. In eugan. floribus.

— *mæra*. Latr. In gramine.

— *dejanira*. Latr. In eugan. lolio. *Raro*.

— *briseis*. Latr. In eugan. floribus. *Raro*.

— *semele*. Latr. In sylvis.

— *hermione*. Latr. id. *Raro*.

— *circe*. Latr. In eugan. gramine. *Raro*.

— *phædra*. Latr. In avena elatiori.

— *ligea*. Latr. In gramine.

— *ægeria*. Latr. id.

— *galathea*. Latr. id.

— *leucomelas*. Hesp. id.

— *pilosellæ*. Latr. In pilosella.

— *janira*. Latr. In graminosis.

— *aceris*. Latr. In acere. *Raro*.

— *cinxia*. Latr. In hieracio.

— *phoebe*. Latr. In eugan. centaurea scabiosa. *Raro*.

— *maturna*. Latr. In plantagine. *Raro*.

— *pales*. Latr. In eugan. floribus. *Raro*.

Libythæus celtis. Latr. In celto. *Raro*.

Nymphalus populi. Latr. In populo. *Raro*.

— *sibylla*. Latr. In floribus. *Raro*.

— *camilla*. Latr. id. *Raro*.

— *iris*. Latr. In salice.

— *ilia*. Latr. In euganeis. *Raro*.

— *lucilla*. Latr. In floribus. *Raro*.

— *megæra*. Latr. In graminibus.

Vanessa levana. Latr. In urtica dioica.

— *prorsa*. Latr. id.

— *antiopa*. Latr. In salice.

Vanessa atalanta. Latr. In urtica.

— *Io*. Latr. id.

— *cardui*. Latr. In carduis.

— *polychloros*. Latr. In fruticis, et in domibus hibernat.

— *v-album*. Latr. In salice. *Raro*.

— *urticæ*. Latr. In urticis.

— *c-album*. Latr. id.

Argynnis paphia. Latr. In viola canina. *Raro*.

— *aglaja*. Latr. id. *Raro*.

— *lathonia*. Latr. In floribus.

— *euphrosine*. Latr. In viola montana. *Raro*.

— *selene*. Latr. In floribus. *Raro*.

— *niobe*. Latr. In viola tricolori. *Raro*.

— *lucina*. Latr. In graminibus. *Raro*.

— *cynthia*. Latr. In populo. *Raro*.

— *dia*. Latr. In plantagine.

— *daphne*. Latr. In eugan. rubo idæo. *Raro*.

Papilio podalyrius. Fab. *Pavegio*. In brassica.

— *machaon*. Fab. In umbellatis.

Parnassius apollo. Latr. In eugan. sedo. *Raro*.

— *mnemosyne*. Latr. In eugan. florib. *Raro*.

Thais hypsiphyle. Latr. In aristolochia.

Pieris cratægi. Latr. In fruticis.

— *brassicæ*. Latr. *Calalin*. In brassica.

— *rapæ*. Latr. id.

— *napi*. Latr. In oleraceis.

— *sinapis*. Latr. In brassica.

— *daplidice*. Latr. In reseda.

— *cardamines*. Latr. In cardamine.

— *edusa*. Latr. In eugan. floribus.

— *eupheno*. Latr. id. *Raro*.

— *palæno*. Latr. In coronilla varia.

— *hyale*. Latr. In floribus.

— *rhamni*. Latr. In rhamno.

— *cleopatra*. Latr. In euganeis. *Rarissimo*.

Polyommatus betulæ. Latr. In pruno. *Raro*.

— *pruni*. Latr. id.

— *quercus*. Latr. In quercu. *Raro*.

— *boetica*. Latr. In floribus.

— *telecanus*. Strå. id.

— *rubi*. Latr. In eugan. cytiso.

— *arion*. Latr. In floribus.

— *damon*. Latr. In hedyaro onobrichi.

— *cyllarus*. Latr. In meliloto.

— *argiolus*. Latr. In floribus.

— *acis*. Latr. id.

— *argus*. Latr. In genista.

— *corydon*. Latr. In eugan. floribus.

— *adonis*. Latr. id.

— *batus*. Latr. In sedo telephio. *Raro*.

— *hippohoe*. Latr. In sylvis.

Polyommatus virgaureæ. Latr. In *solidagine virgaurea*.
— *pblæas*. Latr. In *floribus*.

FAMILIA 2. HESPERIDES.

Hesperia comma. Latr. In *graminibus*.
— *linea*. Latr. In *floribus*.
— *sylvanus*. Latr. id.
— *paniscus*. Latr. id.
— *malvæ*. Latr. In *malva*.
— *alceæ*. Latr. id.
— *fritillum*. Latr. In *dipsaco*.
— *tages*. Fab. In *floribus*.

TRIBUS SECUNDA. CREPUSCULARIA.

FAMILIA 3. SPHINGIDES.

Smerinthus ocellata. Latr. In *salice*.
— *quercus*. Latr. In *quercu*. *Raro*.
— *populi*. Latr. In *populo*.
— *tiliæ*. Latr. In *tilia*.
Sphinx oenotheræ. Fab. In *oenothera*. *Raro*.
— *nerii*. Fab. In *nerio*.
— *atropos*. Fab. *Testa de morto*. In *solano tuberoso*.
— *pinastri*. Fab. In *pino*.
— *euphorbiæ*. Fab. In *euphorbia*.
— *gallii*. Fab. In *gallo*.
— *lineata*. Fab. id. *Raro*.
— *celerio*. Fab. In *vite*.
— *elpenor*. Fab. In *epilobio*.
— *porcellus*. Fab. id.
— *convolvuli*. Fab. *Nasa fiori*. In *convolvulo*.
— *ligustri*. Fab. In *ligustro*. *Raro*.

FAMILIA 4. ZYGÆNIDES.

Sesia stellatarum. Fab. In *domibus*. In *gallo*.
— *fuciformis*. Fab. In *lonicera*. *Raro*.
— *bombylifomis*. Fab. In *scabiosa*. *Raro*.
— *apiformis*. Fab. In *floribus*. *Raro*.
— *sphegiformis*. Fab. id. *Raro*.
— *asiliformis*. Fab. id. *Raro*.
— *crabroniformis*. Fab. id. *Raro*.
— *culiciformis*. Fab. id. *Raro*.
— *tenthrediniformis*. Fab. id. *Raro*.
— *tipuliformis*. Fab. id. *Raro*.
— *vespiformis*. Fab. id. *Raro*.
— *ichneumoniformis*. Fab. id. *Raro*.
Zygæna filipendulæ. Linn. In *spiræa filipendula*.
— *scabiosæ*. Fab. In *scabiosa*.
— *epialtes*. Fab. In *coronilla*.
Syntomis phegea. Latr. In *quercu*.
— *onobrychis*. Latr. In *hedysaro*. *Raro*.
— *fausta*. Latr. In *floribus*.
Proctris statice. Latr. In *globularia*. *Raro*.
— *pruni*. Latr. In *pruno spinosa*.

TRIBUS TERTIA. NOCTURNA.

FAMILIA 5. BOMBYCITES.

Hepialus humuli. Latr. In *humulo*. *Raro*.
Cossus ligniperda. Fab. In *salicibus*.
Zeuzera æsculi. Latr. In *pyris*.
Saturnia pavonia major. Schr. In *pruno*.
— *pavonia media*. Schr. id.
— *pavonia minor*. Schr. id.
Gastropacha quercifolia. Ger. In *pyro*.
— *ilicifolia*. Germ. In *salice*.
Odonestis pruni. Germ. In *pruno*.
— *potatoria*. Germ. In *graminibus*.
Lasiocampus quercus. Schrank. In *quercu*.
— *trifolii*. Schr. In *trifolio*.
— *processionea*. Schr. In *eugan. pino*. *Raro*.
— *mori*. Schr. *Cavalier*. In *moro chinæ*.
— *rubi*. Schr. In *rubo*.
— *lanestris*. Schr. In *salice*.
— *versicolor*. Schr. In *alno*.
— *neustria*. Schr. In *pomone arboribus*.
— *castrensis*. Schr. In *millefolio*.
— *vinula*. Schr. In *salice*.
— *potatoria*. Schr. In *graminibus*.
Bombyx fascelina. Latr. In *populo*.
— *zigzag*. Latr. In *salice*.
— *bucephala*. Latr. In *quercu*.
— *cœruleo-cephala*. Latr. In *fruticis*.
— *dispar*. Latr. id.
— *pudibunda*. Latr. In *corylo*.
— *monacha*. Latr. In *salice*.
— *antiqua*. Latr. In *pruno*.
— *gonostigma*. Latr. In *betula*.
— *coryli*. Latr. In *corylo*.
— *curtula*. Latr. In *salice*.
— *anastomosis*. Latr. id.
— *anachoreta*. Latr. id.
— *camelina*. Latr. In *alno*. *Raro*.
— *palpina*. Latr. id.
— *libatrix*. Latr. In *salice*.
Cerura furcula. Schr. id.

FAMILIA 6. NOCTUO-BOMBYCITES.

Arctia chrysorrhæa. Latr. In *salice*.
— *caja*. Latr. In *hortis*.
— *purpurea*. Latr. In *pratis salsis*; et in *ribe*.
— *villica*. Latr. In *hortis polyphaga*.
— *hebe*. Latr. In *artemisia*. *Raro*.
— *russula*. Latr. In *lactuca*.
— *lubricipeda*. Latr. In *quercu*.
— *leporina*. Latr. In *salice*.
— *fuliginosa*. Latr. In *gramine*.

Arctia plantaginis. Latr. In plantagine. *Raro*.
 — *pudica*. Latr. In salice. *Raro*.
 — *salicis*. Latr. id.
 — *aëriflua*. Latr. id.
Callimorpha jacobææ. Latr. In senecione.
 — *hera*. Latr. In polygono.
 — *dominula*. Latr. In salice.
 — *matronula*. Latr. In artemisia.
Lithosia grammica. Latr. In plantagine.
 — *complana*. Latr. In quercu.
 — *pulchella*. Latr. In hortis.
 — *quadra*. Latr. In graminosis.
 — *glyphica*. Latr. In verbasco.
Yponomeuta evonymella. Latr. In evonymo.
 — *padella*. Latr. *Ruga dei pomèri*. In pomis.
 — *plumbella*. Latr. id.
 — *strigella*. Latr. In pratis.
 — *barbella*. Latr. id.
 — *pusiella*. Latr. In lithospermo.
 — *fænella*. Latr. In pratis.
 — *cratægella*. Latr. In cratægo.
Oecophora Linneella. Latr. In pratis.
 — *Roesella*. Latr. id.
 — *Geoffroyella*. Latr. id.
 — *flavella*. Latr. In plantis. *Raro*.
 — *calthella*. Latr. In caltha palustri.
Eupoclamus guttella. Latr. In eugan. sedo acri.
 — *mesomella*. Latr. In gramine.
Tinea granella. Latr. *Pavegia del formento*. In granariis.
 — *pellionella*. Latr. *Tarma*. In vestimentis.
 — *flavifrontella*. Latr. In pennis.
 — *tapezella*. Latr. In pellibus.
 — *sarcitella*. Latr. id.
 — *zoologella*. Scop. id.
 — *vestianella*. Latr. In vestimentis.
 — *mellonella*. Latr. *Tarma delle ave*. In alvearibus.
 — *domesticella*. Scop. In domibus.
Adela Reaumurella. Latr. In salice.
 — *Degeerella*. Latr. In hortis.
 — *Sulzella*. Latr. id.
 — *aristella*. Latr. In graminosis.
 — *Swammerdammella*. Latr. id.
 — *Frischella*. Latr. In hortis.
 — *Panzerella*. Latr. In pratis.

FAMILIA 7. NOCTUÆLITÆ.

Noctua fraxini. Latr. In fraxino. *Raro*.
 — *sponsa*. Latr. In quercu.
 — *nupta*. Latr. In salice vitellina.
 — *maura*. Latr. In truncis arborum.
 — *pronuba*. Latr. In thlaspi, senecione.

Noctua chrysis. Latr. In urtica.
 — *italica*. Latr. id. *Raro*.
 — *aceris*. Latr. In àcere.
 — *batis*. Latr. In rubo. *Raro*.
 — *brassicæ*. Latr. In brassica oleracea.
 — *oleracea*. Latr. In oleribus.
 — *glyphica*. Latr. In verbasco.
 — *festuæ*. Latr. In absinthio, et festuca.
 — *meticulosa*. Latr. In mercuriali.
 — *myrtilli*. Latr. In eugan. vaccinio. *Raro*.
 — *delphinii*. Latr. In delphinio.
 — *chi*. Latr. In aquileja.
 — *gamma*. Latr. In oleribus.
 — *psi*. Latr. In alno.
 — *trapezina*. Latr. In corylæ.
 — *persicariæ*. Latr. In fruticis.
 — *oo*. Latr. In quercu.
 — *parallelaria*. Angel. In graminibus.
 — *achatina*. Sulz. In pratis, et in hortis.
 — *mi*. Latr. In medicagine falcata.
 — *pacta*. Latr. In quercu.
 — *spectrum*. Latr. In truncis arborum. *Raro*.
 — *paranympha*. Latr. In pruno.
 — *fimbria*. Latr. In primula veris.
 — *c-nigrum*. Latr. In spinacia oleracea.
 — *exclamationis*. Latr. In senecione vulgari.
 — *circumflexa*. Latr. In millefolio.
 — *interrogationis*. Latr. In urtica.
 — *iota*. Latr. id.
 — *absinthii*. Latr. In absinthio.
 — *abrotani*. Latr. In abrotano.
 — *pteridis*. Latr. In eugan. pteride aquilina.
 — *perspicillaris*. Latr. In eugan. astragallo.
 — *linariæ*. Latr. In antyrrhino linaria.
 — *psi*. Latr. In piso.
 — *mendica*. Latr. In graminosis. *Raro*.
 — *oxyacanthæ*. Latr. In oxyacantho.
 — *atriplicis*. Latr. In atriplice.
 — *pyramidea*. Latr. In pruno, et juglande.
 — *flavo-cincta*. Fab. In pruno ceraso.
 — *typica*. Latr. In salice.
 — *xanthographa*. Latr. In hortis. *Raro*.
 — *runica*. Latr. In quercu. *Raro*.
 — *aprilina*. Latr. id.
 — *ludifica*. Latr. In salice.
 — *tridens*. Latr. In pruno armeniaco.
 — *litura*. Latr. In salice.
 — *persicariæ*. Latr. In fruticis.
 — *tragoponis*. Latr. In tragopogine.
 — *acetosellæ*. Latr. In rumice acetosella.
 — *triplacia*. Latr. In soncho.
 — *asclepiades*. Latr. In asclepiade.

- Noctua rumicis. Latr. In rumice.
 — exoleta. Latr. In oleribus.
 — verbasci. Latr. In verbasco.
 — lactuæ. Latr. In lactuca sativa.

FAMILIA 8. PHALÆNITES.

- Platypteryx betularia. Latr. In betula.
 — hirtaria. Latr. In silvestribus.
 — sambucaria. Latr. In sambuco.
 — vernaria. Latr. In syringa.
 — falcataria. Latr. In alno.
 — alniaria. Latr. In fruticis.
 — syringaria. Latr. In syringa.
 — undulataria. Latr. In salice caprææ.
 — amataria. Latr. In quercu.
 — verspertaria. Fab. In graminosis.
 — lactearia. Latr. In nemoribus.
 — putatoria. Latr. id. *Raro.*
 — striataria. Latr. In umbrosis. *Raro.*
 — punctaria. Latr. In quercu.
 — bidentaria. Latr. In alno.
 — lacertinaria. Latr. In quercu. *Raro.*
 — vibicaria. Latr. In nemoribus. *Raro.*
 — papilionaria. Latr. In betula.
 — prunaria. Latr. In pruno spinosa.
 — piniaria. Latr. In eugan. pino. *Raro.*
 — atomaria. Latr. In centaurea scabiosa.
 — bipunctaria. Latr. In lolio perenni.
 — pusaria. Latr. In alno.
 — wavaria. Latr. In ribe.
 — nivearia. Latr. In graminibus.
 — prasinaria. Latr. In eugan. cythiso.
 — grisaria. Latr. In prat. *Raro.*
 — fulvaria. Latr. id.
 — purpuraria. Latr. In quercu.
 — gilvaria. Latr. In millefolio.
 Phalæna ulmata. Fab. In ulmo.
 — cratægata. Fab. In cratægo.
 — brumata. Fab. In pomonæ arboribus.
 — bilineata. Fab. In lychnide dioica.
 — clathrata. Fab. In ericetis.
 — maculata. Fab. In hortis.
 — grossulariata. Fab. In grossularia.
 — viridata. Fab. In quercu.
 — furvata. Fab. In viburno lantana. *Raro.*
 — notata. Fab. In ericetis.
 — undulata. Fab. In salice caprææ.
 — populata. Fab. In populo.
 — comitata. Fab. In nemoribus. *Raro.*
 — prunata. Fab. In pruno.
 — marginata. Fab. In corylo.
 — miata. Fab. In pruno spinosa. *Raro.*

- Phalæna albicillata. Fab. In eugan. rubo idæo.
 — hastata. Fab. In betula.
 — tristata. Fab. In alno.
 — chærophyllata. Fab. In eugan. chærophyllo.
 — fluctuata. Fab. In pomonæ arboribus.
 — reticulata. Fab. id.
 — chænopodiata. Fab. In chænopodio.
 — duplicata. Fab. In hyperico.
 — alchemillata. Fab. In alchemilla.
 — succenturiata. Fab. In hortis.
 — immutata. Fab. In arboretis.
 — cingulata. Fab. id.
 — urticata. Fab. In hirtica.
 — limbata. Fab. In nemoribus.
 Botys potamogata. Latr. In potamogeton.
 — stratiolata. Latr. id.
 — nymphæata. Latr. In nymphæa.
 — lemnata. Latr. In lemna.
 — farinalis. Latr. In domibus quisquiliis.

FAMILIA 9. PYRALITES.

- Herminia rostralis. Latr. In carpine.
 — palpalis. Latr. In domibus hybernatis.
 — forficalis. Latr. In brassica.
 — tristalis. Latr. In prat. *Raro.*
 — undalis. Latr. id. *Raro.*
 — verticalis. Latr. In zea mays.
 — cineralis. Latr. In prat.
 — secalis. Latr. Inter culmos secalis.
 — purpuralis. Latr. In prat. *Raro.*
 — argentalis. Latr. In urtica.
 — atralis. Latr. In prat.
 — barbalis. Latr. In trifolio pratensi.
 — tentacularis. Latr. In taraxaco.
 — proboscidalis. Latr. In prat.
 Aglossa pinguinalis. Latr. In domorum quisquiliis.
 Pyralis pomana. Latr. Inter poma.
 — vitana. Latr. In vite.
 — prasinaria. Latr. In alno.
 — fagana. Latr. In eugan. fago. *Raro.*
 — viridana. Latr. In quercu.
 — clorana. Fab. In salice.
 — uncana. Fab. In sylvis.
 — fuscana. Fab. In nemoribus.
 — xylosteanæ. Fab. In xylosteo.
 — communanæ. Fab. In prat. *Raro.*
 — arcuana. Fab. In corylo.
 — holmiana. Fab. In pomonæ arboribus.
 — Rolandriana. Fab. In eugan. veratro. *Raro.*
 — gnomana. Fab. In fruticis. *Raro.*
 — oporana. Fab. id. *Raro.*
 — Forskahliana. Fab. In rosa.

- Pyrallis cynosbana*, Fab. In rosæ gemmis.
 — *resinana*, Fab. In eugan. pino. *Raro*.
 — *heracleana*, Fab. In umbelliferis.
 — *rutana*, Fab. In foliis rutæ.
Galleria cereana, Latr. In alvearibus. *Tarma delle Ave*.
 — *alvearia*, Latr. id.
Crambus carneus, Fab. In trifolio pratensi.
 — *culmorum*, Fab. In graminosis.
 — *pascuum*, Fab. In pascuis.
 — *pratorum*, Latr. In graminosis.
 — *marginellus*, Fab. id. *Raro*.
 — *argenteus*, Fab. In urtica.
 — *lugubris*, Fab. In pratis. *Raro*.
Alucita xylostella, Fab. In lonicera.
 — *dentella*, Fab. In caprifolio.
 — *vitella*, Latr. In vite.
 — *2-punctella*, Fab. In eugan. echio.
 — *scabrella*, Fab. In hortis.
 — *Sulzella*, Fab. id.
 — *podella*, Fab. id.

FAMILIA 10. PTEROPHORITES.

- Pterophorus monodactylus*, Fab. In hortis.
 — *didactylus*, Fab. In convolvulo.
 — *tridactylus*, Fab. In hortis.
 — *pentadactylus*, Fab. id.
 — *pterodactylus*, Fab. In convolvulo.
 — *tesseradactylus*, Fab. In pratis.
Orneodes hexadactylus, Fab. In lonicera xylosteo.

ORDO SEPTIMUS. DIPTERA.

TRIBUS PRIMA. PROBOSCIDEA.

FAMILIA 1. TIPULARIÆ.

- Xenos Peckii*, Latr. In vespa gallica.
Stylops Melittæ, Kirby. In andrenis.
Culex pipiens, Latr. *Mussato*. In paludosis.
 — *ciliaris*, Linn. id.
 — *annulatus*, Latr. In fenestris domorum.
 — *bifurcatus*, Fab. In paludosis.
 — *trifurcatus*, Latr. id.
 — *minimus*, Linn. id.
 — *claviger*, Meigen. In sylvaticis.
Corethra plumicornis, Latr. In paludosis.
 — *culiciformis*, Latr. id.
Tanypus monilis, Meig. In hortis.
 — *arundineti*, Meig. In arundinetis.
 — *fasciculatus*, Meig. In pratis humidis.
 — *varius*, Meig. id.
Chironomus plumosus, Fab. In paludosis.
 — *annulatus*, Latr. id.
 — *motitatrix*, Latr. id.

- Chironomus pedellus*, Meig. In paludis.
 — *tremulus*, Fab. id.
Ceratopogon communis, Meig. In floribus.
 — *barbicornis*, Meig. id.
 — *pulicaris*, Meig. In domibus infestus.
 — *morio*, Meig. In pratis.
Psychoda phalænoides, Meig. In sterquilinis domorum.
 — *hirta*, Fab. In fenestris.
Cecidomya palustris, Meig. In paludosis.
 — *longicornis*, Meig. In pratis humidis.
 — *pennicornis*, Meig. In clematidis floribus.
 — *hyperici*, Gené. In hyperico perforato.
 — *Woeldickii*, Cont. In avium collectionibus.
 — *juniperina*, Meig. In juniperis.
Ctenophora pectinicornis, Meig. In pratis.
 — *flaveolata*, Fab. In aquosis.
 — *atrata*, Fab. id.
 — *bimaculata*, Fab. In pratis.
 — *paludosa*, Fab. In uliginosis.
Pedicia rivosa, Latr. In aquosis.
 — *tripunctata*, Latr. id.
 — *replicata*, Latr. In aquis. *Raro*.
 — *striata*, Latr. In aquosis.
 — *quadrinaculata*, Latr. In pratis.
 — *ocellaris*, Latr. In paludosis.
Tipula oleracea, Linn. *Verme del formento*. In ole-ribus.
 — *gigantea*, Meig. In paludosis.
 — *lunata*, Linn. In pratis.
 — *pratensis*, Fab. id.
 — *hortorum*, Linn. In hortis.
 — *plumbea*, Fab. In pratis.
 — *crocata*, Linn. id.
 — *cornicina*, Linn. id.
Nephrotoma dorsalis, Meig. id. *Raro*.
Ptychoptera contaminata, Fab. In aquosis. *Raro*.
Limonia picta, Latr. In pratis.
 — *sempunctata*, Latr. In aquosis.
 — *atra*, Latr. In pratis aquosis.
 — *flavescens*, Latr. In pratis.
 — *hiemalis*, Latr. id.
 — *relegationis*, Latr. id.
Ceroplatus tipuloides, Fab. id. *Raro*.
Rhyphus fenestrarum, Latr. In fenestris domorum.
Molobrus Thomæ, Latr. In vigneti.
 — *nigrus*, Latr. id.
Mycetophila lunata, Latr. In boletis.
Bibio hortulana, Latr. In asparago.
 — *johannis*, Latr. In umbrosis.
 — *brevicornis*, Fab. id. *Raro*.
 — *præcox*, Fab. id.

Bibio Marci. Fab. In floribus salicis.
 — *ferruginata*. Fab. In hortis. *Raro*.
Dilophus febrilis. Latr. id.
Scatopse latrinarum. Latr. In latrinis.
Simulium reptans. Latr. *Papatasi*. In domibus.

FAMILIA 2. STRATIOMYDÆ.

Beris nigritarsis. Latr. In pratis. *Raro*.
Stratiomys strigata. Fab. In floribus. *Raro*.
 — *chamæleon*. Fab. In aquis fossarum.
 — *microleon*. Fab. id.
Odontomyia hydroleon. Latr. id.
 — *viridula*. Latr. id.
Ephippium thoracicum. Latr. id.
Nemotelus uliginosus. Fab. id. *Raro*.
Oxycera hypoleon. Latr. In aquosis. *Raro*.
 — *trilineata*. Latr. id.
Sargus cuprarius. Fab. In floribus.
 — *auratus*. Fab. id.
 — *politus*. Fab. id.
 — *xanthopterus*. Fab. id. *Raro*.

FAMILIA 3. TABANII.

Genomyia ferruginea. Latr. In floribus. *Raro*.
Pangonia maculata. Fab. In cæpæ floribus.
 — *marginata*. Fab. id.
Tabanus bovinus. Linn. *Tavaron*. In bobus.
 — *morio*. Linn. id. id.
 — *autumnalis*. Linn. id. id.
 — *albipes*. Fab. In pratis.
 — *bromius*. Fab. *Tavan*. In equo.
 — *rusticus*. Fab. In bobus.
 — *tropicus*. Fab. In pecoribus.
 — *maritimus*. Scop. Ad litora maris.
Hæmatopota pluvialis. Fab. In arundinetis.
Chrysops cæcutiens. Fab. *Tavanella*. id.
 — *lugubris*. Fab. id. id.
 — *salinarius*. Latr. Scop. In maritimis.

FAMILIA 4. RHAGIONIDES.

Pachystomus syrphoides. Latr. In floribus.
Rhagio scolopaceus. Fab. In aquosis.
 — *tringarius*. Fab. In nemoribus. *Raro*.
 — *bicolor*. Fab. id. *Raro*.
Atherix nebulosa. Fab. In floribus. *Raro*.

FAMILIA 5. DOLICHOPODES.

Dolichopus ungulatus. Fab. In aquosis.
 — *4-fasciatus*. Fab. id.
 — *nobilitatus*. Fab. In hortis
 — *nigripes*. Fab. In aquosis. *Raro*.

FAMILIA 6. MYDASH.

Thereva plebeja. Latr. In pratis.
 — *marginata*. Latr. id. *Raro*.

FAMILIA 7. ASILICI.

Asilus tibialis. Latr. Ad sæpes. *Raro*.
 — *crabroniformis*. Fab. id.
 — *nigerrimus*. Willers. id.
 — *forcipatus*. Fab. Ad vias.
 — *cinereus*. Scop. In arenosis.
Laphria gibbosa. Fab. Ad sæpes. *Raro*.
 — *marginata*. Fab. id. *Raro*.
 — *flava*. Fab. id.
 — *atra*. Fab. Apibus infesta.
 — *gilva*. Fab. id. *Raro*.
 — *glancia*. Fab. Ad sæpes.
 — *cineta*. Fab. id.
Dasypogon cingulatus. Fab. id. *Raro*.
 — *punctatus*. Meig. id.
 — *germanicus*. Fab. id.
 — *teutonus*. Fab. id.
Dioctria oelandica. Fab. In hortis. *Raro*.
 — *minuta*. Fab. In sabulosis.
Gonypes tipuloides. Latr. In pratis.

FAMILIA 8. EMPIDES.

Empis pennipes. Fab. Ad fenestras domorum.
 — *livida*. Fab. In floribus.
 — *cinerea*. Fab. In umbellatis.
 — *stercorea*. Fab. id.
 — *forcipata*. Fab. Supra aquas stagnantes.
 — *maura*. Fab. id.
Sicus arrogans. Latr. id.
 — *cimicoides*. Latr. Ad truncos arborum. *Raro*.
Hybos asiliformis. Latr. In floribus. *Raro*.

FAMILIA 9. ANTHRACII.

Anthrax morio. Fab. In floribus.
 — *maura*. Fab. id.
 — *hottentotta*. Fab. id.
 — *æthiops*. Fab. id.
 — *sabæus*. Fab. id.

FAMILIA 10. BOMBYLIARII.

Bombylius major. Linn. In hortis.
 — *medius*. Linn. In floribus.
 — *minor*. Fab. In hortis.
 — *fuscus*. Fab. In floribus. *Raro*.
 — *ater*. Fab. id.
 — *minimus*. Fab. id.
Usia florea. Meig. id.

FAMILIA 11. INFLATA.

Ogcodes gibbosus. Latr. In floribus.

FAMILIA 12. SYRPHIÆ

Rhingia rostrata. Fab. In floribus.

— lineata. Fab. id. *Raro.*

Volucella inanis. Latr. id.

— pellucens. Latr. In umbrosis.

— bombylans. Latr. id.

— mystacea. Latr. id.

— dryophila. Schr. In floribus.

Eristalis Narcissi. Fab. In radicibus liliaceorum.

— inflata. Latr. In floribus.

— oestraceus. Fab. id.

— vulgaris. Latr. id.

Elophilus cinereus. Latr. id. *Raro.*

— tenax. Latr. In fimetis.

— pendulus. Latr. In aquis stagnantibus.

— florens. Latr. In floribus.

— nemorum. Latr. id.

— arbustorum. Latr. In arbustis.

— glaucius. Latr. In floribus.

— æneus. Latr. id.

Syrphus conopseus. Latr. In hortis.

— festivus. Latr. id.

— mussitans. Fab. id.

— cæmeteriorum. Latr. id.

— ribesii. Latr. Inter aphides ribeos.

— pyrastri. Latr. Inter aphides pyri.

— mellinus. Latr. Inter aphides.

— menthastri. Latr. id.

— scriptus. Latr. id.

— nectareus. Latr. In floribus.

Paragus bicolor. Latr. id. *Raro.*

Chrysotoxum bicinctum. Latr. id.

— arcuatum. Latr. id.

Aphritis mutabilis. Latr. In pratis. *Raro.*

— auropubescens. Latr. id.

— apiarius. Latr. In floribus. *Raro.*

Milesia clavipes. Latr. id.

— segnis. Latr. id.

— vespiformis. Latr. id.

— pipiens. Latr. id.

— sylvarum. Latr. id. *Raro.*

— podagrica. Latr. id.

FAMILIA 13. CONOPSARIÆ.

Conops vescicularis. Fab. In nemoribus.

— nigra. Will. In floribus. *Raro.*

— aculeata. Fab. id.

— vulgaris. Scop. id.

— flavipes. Fab. id.

Conops petiolata. Will. In floribus.

— rufipes. Fab. id.

Myopa dorsalis. Fab. id.

— ferruginea. Fab. id.

— buccata. Fab. id.

Zodion cinereum. Latr. id. *Raro.*

Stomoxys calcitrans. Fab. *Mosca che becca.* Ad pedes boum.

— irritans. Fab. In pecoribus.

— pungens. Fab. id.

— siberita. Fab. In equis. *Raro.*

FAMILIA 14. MUSCIDES.

Oestrus equi. Fab. In equorum ventriculo.

— ovis. Fab. In ovium sinu frontis.

— bovis. Fab. In dorso boum.

— hæmorrhoidalis. Fab. In equorum intestinis.

Echinomyia grossa. Latr. In stercore bovino.

— meridiana. Latr. In nemoribus.

— fera. Latr. id.

Ocyptera lateralis. Fab. In domibus.

— cylindrica. Fab. *Mosca cavallina.* id.

— puparum. Latr. In glossatorum pupis.

— larvarum. Latr. In glossatorum larvis.

— tremula. Latr. In plantis. *Raro.*

— rotundata. Latr. id. *Raro.*

Phasia subcoleoprata. Latr. In floribus.

Musca roralis. Latr. In arboretis.

— grossificationis. Latr. In frutetis.

— tripunctata. Scop. In floribus.

— meticulosa. Scop. id. *Raro.*

— deceptoria. Scop. In pratis. *Raro.*

— carnaria. Fab. *Moscon.* In cadaveribus.

— vomitoria. Fab. id. id.

— cæsar. Fab. *Mosca d'oro.* id.

— tigrina. Fab. In floribus.

— rudis. Fab. id. *Raro.*

— belluo. Fab. In pratis.

— domestica. Fab. *Mosca.* In domibus.

— prostrata. Scop. In fenestris.

— cæsarina. Scop. In sterquiliniis.

— maculata. Fab. In cadaveribus.

— cornicina. Fab. In floribus.

— cadaverina. Fab. In cadaveribus.

— mortuorum. Fab. id.

— radicum. Fab. In raphani radicibus.

— canicularis. Fab. In umbrosis.

— festinans. Scop. In plantarum foliis.

Anthomyia pluvialis. Latr. *Mosca che becca.* In hortis.

— meditabunda. Latr. id.

— meteorica. Meig. In domibus choreas agens.

— serrata. Latr. In latrinis.

Lispe tentaculata. Latr. In latrinis.
Scenopinus fenestralis. Fab. In fenestris domorum.
Tetanocera obliterata. Latr. In floribus. *Raro*.
 — *reticulata*. Latr. id.
 — *marginata*. Latr. id.
 — *umbrarum*. Latr. id.
 — *cucularia*. Latr. In stercore.
 — *graminum*. Latr. In floribus.
Oscinis. lineata. Fab. In caulibus hordei, spicas destruens.
 — *frit*. Fab. id.
 — *oleæ*. Fab. In oleæ fructibus.
Platystoma seminationis. Latr. In arboribus.
Tephritis arnicæ. Fab. In floribus.
 — *cerasi*. Fab. In cerasorum nucleis.
 — *cardui*. Fab. In cardui floribus.
 — *sostitialis*. Fab. id.
 — *arnicæ*. Fab. In floribus.
 — *vibrans*. Fab. In arboretis.
 — *florum*. Fab. In floribus.
 — *flava*. Fab. In fenestris.
 — *umbellatarum*. Fab. In umbellatis.
 — *putris*. Fab. In caseo, et fimetis.
Micropeza cynipsea. Latr. In floribus.
 — *punctum*. Latr. In umbrosis.
Loxocera ichneumonea. Fab. In floribus. *Raro*.

Mosillus cellarius. Latr. In cellis vinariis.
Scatophaga scybalaria. Latr. In stercore.
 — *stercoraria*. Latr. id.
 — *fimetaria*. Latr. id.
 — *urticæ*. Latr. In urtica.
Thyreophora furcata. Latr. In floribus. *Raro*.
Sphærocera curvipes. Latr. Ad fenestras domorum.

TRIBUS SECUNDA. EPROBOSCIDEA.

FAMILIA 15. CORIARIACEÆ.

Ornithomyia viridis. Latr. In avibus.
 — *avicularia*. Latr. id.
 — *hirundinis*. Latr. In hirundinibus.
 — *corvi*. Latr. In corvis.
Hippobosca equina. Latr. *Mosca cagnina*. In equibus, canibus.
Melophagus ovinus. Latr. Inter ovium lanam.

TRIBUS TERTIA. PUTHIROMYLÆ.

Nycteribia vespertilionis. Fab. In vespertilione murino.

ORDO OCTAVUS. SUCTORIA.

Pulex irritans. Linn. *Polse*. Undique infestus.
 — *fasciatus*. Bosc. In talpa, et mure.



SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 01348 9208